

BOMBARDIER SUGAR

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 7.8%

Σύνθεση

	(%β/ο)	(%β/β)
Ελεύθερα Αμινοξέα	10.3	7.8
Ολικό Άζωτο	6.6	5.0
Οργανικό Άζωτο	3.3	2.5
Αμμωνιακό Άζωτο	3.2	2.4

pH: 5 - 7 · Πυκνότητα 1,30-1,33 g/cc



ΣΗΜΕΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
AGRICULTURA BIOLOGICA

Οικολογικό προϊόν

Αμινόγραμμα: Ασπαρτικό Οξύ (0,83%), Γλουταμικό οξύ (5,45%), Αλανίνη (0,99%), Αργινίνη (0,01%), Φαινυλαλανίνη (0,01%), Γλυκίνη (0,04%), Ιστιδίνη (0,01%), Ισολευκίνη (0,01%), Λευκίνη (0,02%), Λυσίνη (0,01%), Προλίνη (0,31%), Σερίνη (0,03%), Τυροσίνη (0,02%), Θρεονίνη (0,01%), Και βαλίνη (0,05%).

Ταξινόμηση σε βαρέα μέταλλα: Κατηγορία Α Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα είναι μικρότερη από των επιτρεπόμενων ορίων για αυτή την κατάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. Εγγραφής: 2753

Αριθμός Παρτίδας: 004/19

Ημερομηνία παραγωγής: 10/06/2019

Ημερομηνία λήξης: 3 χρόνια

Το BOMBARDIER SUGAR είναι νέας γενιάς βιοδιεγερτής, που είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά από την Agroindustrial Kimitec. Παραγόμενο από τη βακτηριακή ζύμωση (*Corynebacterium* spp.) της οργανικής φυτικής ύλης.

Ξεκινώντας με τις βασικές παροχές και τα ωφέλη των αμινοξέων (ειδικό αμινόγραμμα), προκαλούμε την αύξηση και την βελτίωση στο τομέα των μονο,ολιγο και πολυσακχαριτών

Το BOMBARDIER SUGAR ενισχύει τις καλλιέργειες με μία καλύτερη και αυξημένη σύνθεση δυο κύριων πολυσακχαριτών όπως είναι η κυτταρίνη (δομική λειτουργία) και το άμυλο (backup λειτουργία) μεταξύ άλλων.

Εξασφαλίζοντας μία άμεση επίδραση στην ωρίμανση, τον χρωματισμό και τέλος ευνοεί την αύξηση σε βαθμούς Brix.

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Δόσεις και μέθοδος εφαρμογής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΟΣΕΙΣ	ΣΥΣΤΑΣΗ
Στο φύλλωμα	2 - 4 cc/l	Συσιστώνται 2 με 3 εφαρμογές, ανάλογα την καλλιέργεια
Υδρολίπανση	20 l/Ha	

Καλλιέργεια Εφαρμογές

Οπωροκηπευτικά (ντομάτα, πιπεριές, μελιτζάνες)
Εφαρμόστε κατά το στάδιο της αύξησης του μεγέθους των καρπών κάθε 7-10 μέρες.

Κολοκυνθοειδή (πεπόνι, καρπούζι)

Πρώιμα Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 φορές, 30 και 15 μέρες πριν την συγκομιδή.

Όψιμα: Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 φορές, 25 και 10 μέρες πριν την συγκομιδή.

Φρούτα (μάνγκο, αβοκάντο, εσπεριδοειδή, μπανάνες κ.α.) Εφαρμόστε 45,30 και 20 μέρες πριν την συγκομιδή.

Άμπελι Εφαρμόστε 6-8 εβδομάδες πριν την συγκομιδή.

Συστάσεις: Για συνεχιζόμενη χρήση σε δοχεία υδρολίπανσης συνιστάται η διάλυση του προϊόντος σε αναλογία έως 50%, έτσι ώστε να αποφύγουμε την απώλεια μέρους των ιδιοτήτων του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρίψτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P401 Αποθηκεύεται μακριά από φεγγίτη, ποτά και ζωοτροφές. P411+ P235 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C. Διατηρείται δροσερό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων.



KIMITEC  agro

Κάτοχος και Κατασκευαστής

Agroindustrial Kimitec S.L.

Calle Santa María, nº 13, Raquetas de Mar (Almería), 04740. Ισπανία.

Τηλέφωνο: + 34 950 34 69 09 | kimitecgroup.com



MAKING A VISION