

STARTVAC®

Ενέσιμο γαλάκτωμα για τα
Βοσειϊδή (αγελάδες και μοσχιίδες)

ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ (2 ml) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

E. coli (J5) βρανοποιημένη > 50 RED₅₀
(Κοκιλική αποτελεσματική δόση στο
60 % των ζώων (ορολογικά)).

S. aureus (CP8) στέλεχος SP 140
αβρανοποιημένο, εκφρασμένο ως Slime
Associated Antigenic Complex (SAAC) > 50
RED₅₀ (στο 80 % των ζώων).

Υγρή παραφίνη: 18,2 mg
Βενζυλική αλκοόλη: 21 mg

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

Ενέσιμο γαλάκτωμα.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ):

Βοσειϊδή (αγελάδες και μοσχιίδες).

STARTVAC®

Ενέσιμο γαλάκτωμα για τα
Βοσειϊδή (αγελάδες και μοσχιίδες)



8 427711 121213

EU /2/08/092/004

ΕΙ: ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ψυχάρα 3 / 184 53 Νίκαια - ΕΛΛΑΣ
Τηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661
e-mail: greece@hipra.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική
συνταγή. Να φυλάσσεται σε θέση, την
οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν
τα παιδιά. Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε
ψυγείο (2 °C - 8 °C), προστατευμένο από
το φως. Μην καταψύχετε.

Παράδει:

Αριθ:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avd. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN



1 φιαλίδιο 5 δόσεων (10 ml)

STARTVAC®

Ενέσιμο γαλάκτωμα για τα
Βοσειϊδή (αγελάδες και μοσχιίδες)



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Ενδομυϊκή χορήγηση.
Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν
από τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Μηδέν ημέρες.

Η εξ ατυχήματος αυτοένεση με το προϊόν
είναι επικίνδυνη- Βλ φύλλο οδηγιών
χρήσεως, πριν από τη χρήση.

Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση εντός
περιόδου 10 ωρών φυλάσσόμενο στους +15
ως +25 °C.

Απόρριψη: Βλ εσωκλειστο φύλλο οδηγιών
χρήσης.

702835-01.0
03-14

