

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στη ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηνιά. Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική κίνηση και διελασματική δράση.

Αρ. Εγγραφής: 2391

Εγγυημένη σύνθεση:

Cyprodinil 50 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 49,5 % β/β

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του, αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Φάσμα δράσης:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*) 75 γρ./δεκάριο (max) ή 30-50 γρ./100L ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων. Ψεκασμός φυλλώματος με προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές (μέχρι 48 ώρες από την έναρξη της μόλυνσης). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: •Για **Φαίά Σήψη Ανθέων και Βλαστών** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) 45 γρ./δεκάριο (max) ή 30 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογές από την ανάπτυξη του παθογόνου, από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. •Για **Φαίά Σήψη Καρπών** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) 75 γρ./δεκάριο (max) ή 50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά: Για **Φαίά Σήψη Ανθέων και Βλαστών** (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructicola*) 75 γρ./δεκάριο (max) ή 30-50 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:
Μηλοειδή: 21 ημέρες. **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά:** 7 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 9

1) Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με CHORUS 50 WG. Το σκέυασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες. **2)** Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: ---



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Δηλώσεις Προφύλαξης: •Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να αποφεύγετε τη ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες.

“Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.”

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκουράστε. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απараβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεων: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι οικολογίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3