

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυηχτικών και μασητικών εντόμων. Το Deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκρίμενα στους διαλύους των ιόντων Να στις προσανατοπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Εγγυημένη σύνθεση:
Deltamethrin: 2,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% β/β
Γαλακτωματοποιημένο υγρό (EC)

Αριθμός Άδειας: 3688

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ακευασματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέπ-φρουτ, Νεράτζια): **Αφίδες:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Λεκάκια Μύγα της Μεσογείου:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Ένας (1) ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προβόλων. ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμφιγάλα, Φοτικά, Φουτουσκιά, Καροδιά, Καστανιά): **Αφίδες:** 30 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 42-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 140 λίτρα/δέκαριο. **Καρπόκαφα καρδιάς, Καρπόκαφα καστανιάς:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 42-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προβόλων. **Ευρώτιμο:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την έναρξη των πτήσεων των ακμίων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αγλαδία, Κυδανιά, Μουμουλιόλι): **Καρπόκαφα μηλιάς, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς:** 30-50* κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Φυλλοδόττες:** 35 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 35-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Ψύλλα αγλαδίας:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ** (Ροδάκινά, Νεκταρίνα, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κεράσι, Βυσσινιά): **Φυλλοδόττες, Ανάσπια:** 35 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 35-49 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Ραγολέτιδα:** 40-50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 40-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Μύγα λευκοσίου:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Αφίδες, Καρπόκαφα Δαμασκηλιάς:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Ένας (1) ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. ΑΜΕΛΙΤΑ*** **Ευδειμία: 1^η γενεά:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και **2^η και 3^η γενεά:** 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Κοχλιάδα:** 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Τζιτζικιά:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΦΡΑΥΛΙΑ** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): **Αφίδες:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 25-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΕΛΙΑ: Δάκος, Λεκάκι:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. Για τον **Δάκο Ένας (1) ψεκασμός** σύμφωνα με τις συστάσεις των ακμίων στις παγίδες και για το **Λεκάκι Ένας (1) ψεκασμός** με την εμφάνιση των προβόλων. **Βαρβακάδα:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Ένας (1) ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. Πυρηνοτήριες:** 30 (ανθόβια) + 50 (καρπούβια) κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 100-140 λίτρα/δέκαριο. **Μία (1) εφαρμογή** στη έναρξη της άνηθης (ανθόβια) και αμέσως μετά την καρποδότη (καρπούβια γενεά) μεταξύ ωοθιαίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συστάσεις των ακμίων στις φερομονικές παγίδες. **ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΠΡΑΣΟ, ΣΚΟΡΔΟ:** **Θρίπας, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 40-50 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΣΟΛΑΝΟΕΙΔΗ** (Υπαίθρου: Τομάτα, Πεπεριά, Μελιτζάνα & Θερμοκηπίου: Πεπεριά): **Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, **(Υ)** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη) και **(Θ)** 30-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού **(Υ)** 60-100 λίτρα/δέκαριο και **(Θ)** 60-140 λίτρα/δέκαριο. **Βρυσόβια:** 30 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, **(Υ)** 18-30 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη) και **(Θ)** 18-42 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού **(Υ)** 60-100 λίτρα/δέκαριο και **(Θ)** 60-140 λίτρα/δέκαριο. **Αλευρόβια:** **(Θ)** 70 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 42-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (Θ)). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δέκαριο **(Θ)**. **Κορτοσκοκίλια:** **(Υ)** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δέκαριο **(Υ)**. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Υπαίθρου: Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. Θερμοκηπίου: Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΣΟΛΑΝΩΔΗ** (Θερμοκηπίου: Τομάτα, Μελιτζάνα): **Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Αφίδες:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (Θ)). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δέκαριο **(Θ)**. **Βρυσόβια:** 30 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 18-42 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο(Θ)). Όγκος ψεκ. υγρού 60-140 λίτρα/δέκαριο **(Θ)**. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τέσσερις (4) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΚΟΛΟΥΥΝΘΟΕΙΔΗ** (Αγρούρι, Αγγουράκι, Κολοκίθι, Πεπόνι, Καρπάζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): **Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Αφίδες:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, **(Υ)** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη) και **(Θ)** 30-70 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού **(Υ)** 60-100 λίτρα/δέκαριο και **(Θ)** 60-140 λίτρα/δέκαριο. **Κορτοσκοκίλια:** **(Υ)** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/δέκαριο **(Υ)**. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΛΑΧΑΝΟ** (εκτός από το κινέζικο), **ΚΟΝΥΟΥΠΙΛΑ, ΜΠΡΟΚΟΛΙ:** **Περίβια, Μαμίστρα, Πλούζα, Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/δέκαριο. **Πουτέλια:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΨΥΧΑΝΘΗ** (Θαλασσία, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια): **Πράσινο ακοκίλη, Αφίδες, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΜΑΡΟΥΛΙ** (Υπαίθρου): **Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Άλτις, Αφίδες:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 25-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δέκαριο. **Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΦΥΛΛΑ ΣΤΑΙΝΟΥ, ΡΟΚΑ:** **Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμίστρα, Άλτις:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 35 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα/δέκαριο. **Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΜΠΕΛΛΙΑ ΘΡΕΣΚΙΑ:** **Αφίδα των μητζελιών, Στόνας:** 25 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Αφίδα των κουκιών, Κάμπια των μητζελιών, Θρίπας, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΑΓΚΙΝΑΡΑ:** **Κασσία:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. **Προντένια, Αφίδες:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΠΑΤΑΤΑ-Δορυφόρος:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα/δέκαριο. **Σποντόπτερα:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΚΑΠΙΝΟΣ:** **Θρίπας, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7 ημερών. ΖΑΧΑΡΟΤΥΓΑΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡ:** **Αφίδες, Μύγα τεύτλων, Άλτις, Σποντόπτερα, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/δέκαριο. **Κασσία:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/δέκαριο. **Ένας (1) ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. ΑΡΑΒΟΣΤΟΧ***:** **Πυραλίδα, Σφέζα, Πράσινο ακοκίλη, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κορτοσκοκίλια:** 30-50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 14-21 ημερών. Diabrotica virgifera:** 50 κ.εκ. ακευασματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με**

μεσοδιστήματα εφαρμογών 7-14 ημερών. ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): **Αφίδες, Κοφτοσκούληκα:** 30-50 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 40-60 λίτρα /δέκαριο. **Ένας (1) ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. ΜΗΔΙΚΗ:Αφίδα των μηλιών, Σκαθάρι των μηλιών, Φυτονόμος:** 25 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτρα /δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιστήματα εφαρμογών 14 ημερών.**
BAMBANI: Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι: 50-70 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα /δέκαριο. **Αλευρώδης, Τζιτζικιάκα:** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο (μέγιστη). Όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα /δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. **Μέχρι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιστήματα εφαρμογών 14 ημερών. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ** (Υπάθρου και Βερμοκρηπίου): **Αφίδες, Όριπες (Thrips tabaci):** 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη) 25-50 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα /δέκαριο. **Φυλλοδέτες:** 35 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 17,5-35 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα /δέκαριο. **Αλευρώδης:** 70 κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη 50 κ.εκ. σκευάσματος/ δέκαριο). Όγκος ψεκ. υγρού 70 λίτρα /δέκαριο. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβόλων. **Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με μεσοδιστήματα εφαρμογών 7ημερών.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ * ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/ 100λίτρα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λί/δέκαριο) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο δέκαριο. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων. ** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελοφυλλών στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. *** Η εφαρμογή του DELMUS στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μοκοζιτών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.* στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει.

Τελευταία έμβραση πριν τη συγκομιδή: Βαρβάκι, Ζαχαροσίδη, Παντζάρι, Εσπεριδοειδή, Ακρόρρυα, Αραβόσποτα, Σιτηρά: **30 ημέρες.** Μηδική, **14 ημέρες.** Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόροδο, Λάχανο (εκτός από κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φαγόσι, Ρεβίθια, Μπιζέλια, Καπνός, Μπλιλά, Αγγούρια, Κιδοάνη, Μουμουλιά, Ροδάκινά, Νεκταρίνια, Βερκοκιά, Διαμοκρητιά, Κεράσι, Βυσσινιά, Φύλλα Σελίνου, Μαϊντανός: **7 ημέρες.** Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φρούαλο, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινιόρα: **3 ημέρες.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικιστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3'. - Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. - Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής υφιστάμενης. - Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. - Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DELMUS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. - Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών εντόμων / στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας. **Ειδικό σύστημα μικροκρομμίου,** έτσι ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οδοντήσιμα ανάπτυξη ανθεκτικότητας. - Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- **Για δενδροειδείς καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.**

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό σφόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Συνδυσαστικότητα:--



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αιμιο εύφλεκτο. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάπτωσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάπτωσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπηλμία ή ζέλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνια επιπτώσεις.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμείς επιφάνειες - Μην καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνέετε εκκυματώματα. Πίνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Μαζέψτε τη χαμένη ποσότητα. Να αποφεύγεται η ελεύθερη αποστολή στο περιβάλλον. «Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο γέλιο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.» «Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.» Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά: **-5 μέτρα** για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδροειδείς και τα αμπέλια ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **-15 μέτρα** για τις δενδροειδείς καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. -Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρα** για τις υπαίθριες καλλιέργειες και καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 cm ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90% από τη μηχανική γη. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από τη μηχανική γη για τις δενδροειδείς καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσιμα μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. **Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.**

"Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση κατάπτωσης** Κλάτε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιάθεσια. ΜΗΝ ΠΙΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΙΣ. **Πληροφορίες για το γιατρό:** **Δεξαμενικό μέτρο: Επιπτώσεις χειρισμού:** Συμπτωατικά και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, εντάλαξη τοπικά ανασθητικών σταγόνων π.χ. 1% atropine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Αντιμετώπιση σπασμών:** Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβια. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να προμηθεί πλήρως ο παθόν. Για παιδιά 2.5mg ενδοφλέβια. **Αντενδείξεις:** Ατροπική και παράγωγα αδρεναλίνης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίψιμο ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεων: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως: οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Srl
Διανομέας: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd - Τηλ: +35722815353 - Λευκωσία

LE/DELMUS/CY/3