

Dicarzol 50SP

Dicarzol 50SP

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών

Αρ. Εγγραφής: 2777

Εγγυημένη σύνθεση:

Formetanate 50,0% β/β

Βοηθητικές ουδίες 45,6% β/β

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΩΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρι απορροής.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*), 125 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού), Όγκος ψεκ. υγρού 80 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (ΒΒCH63-64) φροντίζοντας να διαβρέχει προσεκτικά η ζώνη των τσαμπιών. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα φεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **1 εφαρμογή.**

Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*), 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού), Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα φεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **1 εφαρμογή.**

Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*), 125 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού), Όγκος ψεκ. υγρού 80 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. **1 εφαρμογή.**

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Pumpkins) (Υπαίθρου): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*), 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα φεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **2 εφαρμογές με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.**

Μαρούλι, Αντίδι (Υπαίθρου): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*), 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού), Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. BBCH 14-15. **1 εφαρμογή.**

Φράουλα (Υπαίθρου): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*), 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού), Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων. **1 εφαρμογή.**

Τριανταρυλλιά, Γαρυφαλλιά, Χρυσάνθεμο, Ζέρμπερα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): **Θρίπες** (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*), 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα / δεκ., 100 γρ. σκ./δεκ. μέγιστη. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. **1 εφαρμογή.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Y+θ), Μελιτζάνα (Y+θ), Φράουλα (Y): **14 ημέρες**, Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y), Κολοκύθα (Y): **3 ημέρες**, Αμπέλι, Μαρούλι (Y), Αντίδι (Y), Πιπεριά (θ), Καλλωπιστικά (Y+θ), Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια: **Μη εφαρμόσιμο** (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείες ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: **Ομάδα Τρόπου Δράσης: 1A.** Να εναλλάσσεται με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από αλκαλικές ενώσεις και το θείο.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Εάν ζήτησετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφέύγετε να αναπνέετε οκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες. Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους **5 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιαστές να μην χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψετε τα ζιζανία πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε κάθε περίπτωση οι μελισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λεωφέματα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειική ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM. Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο έντρο, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πώλησης: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

Τηλ.: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

Gowan Crop Protection Limited