



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλέστε σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φορτάτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα αποτυπής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Απορρέυτε να αναπνέετε αναθυμίσιας / αέρα / ατμούς / εκνευρώματα. Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύουμα ή τα κενά συσκευασίας του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψεκτή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά υδάτα. Για να προστατέψετε τα φυτά με στόχους να αφήσετε μια αψεκτή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις διαδικασίες χρήσης:

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δύνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Γενικές συμβουλές: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιάθεσία, ζητήστε αιτιαρική συμβουλή (βείτε την ετικέτα όπου έναν διανοτικό). Εάν ζητήστε αιτιαρική συμβουλή, να ξέχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΝΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόνα στον καθρέ αέρα και αιρήστε τον να ξέκουραστε σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρμόστε ολγυνότα τεχνητή αναπνοή έως που απαιτείται. Ζητήστε αιτιαρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άμβρον νερό και σαπονό. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Ανατητήστε αιτιαρική συμβουλή έως που απαιτείται. Ζητήστε αιτιαρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φράκτες, αφαίρεστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμός, αφαίρεστε τον παθόνα σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλεύεσθε / Επισκεφθείτε αιμέδως γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Ακολουθήστε συμπληματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβιαστή συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει οτανθέρω 2 χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι αδέστρες συσκευασίες ζειπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έξτηλμα. Τα νερά του ζειπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρηπτικά, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις ποιότητές της, εμπειρίες, και γνώσεις. Πολλοί παράνοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώντας το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δεν φέρουμε κακιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
βλέπε επί της συσκευασίας

Περιεχόμενο: 1L



Dicotex
SL (2,4-D 70 g/L, MCPA 70 g/L,
Mecoprop-P 42g/L, Dicamba 20g/L)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ιατρικού διάλυματος: Γεμίζετε το ψεκαστικό δόχειο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την αποτυπώμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται το ξέπλυμα του ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μή χρησιμοποιήστε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε.

Μην ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Φάσμα Δράσης: Πεδίο Εφαρμογής: Χλοοτάπητες αγρωτικώδων.

Εχθρός / Αιτιαρικά / Ζιζάνιο που λέγενται: **Πλατύφύλλα Ζιζάνια**: Τριφύλλια (*Trifolium sp.*), Αγριοράδικα (*Taraxacum sp.*), Ρανούκουλος (*Ranunculus sp.*), Πολυκόπτη (*Polygonum sp.*), Καρδαμίνια (*Cardamine sp.*), Στελάρια (*Stellaria media*), Περικούλι (*Anagallis arvensis*), Αγριοκαρόπα (*Daucus carota*), Κεράπιο (*Ceratium sp.*), Ζωγρός (*Sonchus sp.*), Γαϊδουράγκαθο (*Carduus sp.*), Κίριος, Αστράπακαθο (*Cirsium sp.*), Πεντάνευρο (*Plantago sp.*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*, *Senecio jacobaea*), Αγριομαργαρίτα (*Bellis perennis*), Λάπαθο (*Rumex sp.*).
Δόσεις: 10 κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκ. υγρού (ή 100 κ.εκ. σε 10 λίτρα).

Χρόνος εφαρμογής: Δεν εφαρμόζεται πριν το στάδιο του αδελφώματος της χλόης. Μία εφαρμογή από Απρίλιο - Σεπτέμβριο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν την διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγειές ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόντος υποφέρει να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Εφαρμόζετε το σκεύασμα τουλάχιστον 3 ημέρες μετά το τελευταίο κούρεμα του χλοοτάπτη και περιμένετε το τουλάχιστον 7 ημέρες για το επόμενο. Μήν εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 25°C υπό οικά. Μην ψεκάζετε νεαρή λόη πριν το αδέφωμα και εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση. Η δραστικότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως). Απούρετε εφαρμογές από την έρημη περίοδο και όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών. Εφαρμόζετε στεγνό γρασίδι. Δεν συστήνεται η χρήση του μεριάς μετά από δραστική / κοντή κοπή. Μήν χρησιμοποιείτε τα υλικά από τα τρία πρώτα κούρεματα για την παρασκευή κομπότας. Μήν ψεκάζετε λιβαδιά καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο τριφύλλι. Τα ψεκασμένα φτάνουν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ωμοτροφή. Να μην εφαρμόζεται σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγήσει σε ομηρία παροχής νερού (ρυάκι, δεξαμενή, λίμνη, πηγάδι), ιδιαίτερα αν το έδαφος είναι επικλινές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- 1) σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Περιμένετε 6-8 εβδομάδες πριν την επαναφύτευση.
- 2) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην ζώων στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάραγγα ζώων για 15 μηνές μετά την εφαρμογή. Απαγορεύεται η πρόσβαση σε ψεκασμένες περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει επειδή, δηλαδή ο ώρες μετά την εφαρμογή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Συνδυαστικότητα:---

L/DICOTEX/1L/CY/1