

HIPRABOVIS® BALANCE

Κόνις και διάλυμα για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Tel.: 34972430660 Fax: 34972430661

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)Σ:

Σύνθεση του εμβολίου (ανά δόση 3 ml):

Δραστικά συστατικά:

Αδρανοποιημένος Ιός PI-3 στέλεχος SF-4. 10⁶ TCID₅₀

Αδρανοποιημένος Ιός BVD στέλεχος NADL 10⁶ TCID₅₀

Εξασθενημένος Ιός BRS στέλεχος Lym 56 10⁵ TCID₅₀

Λυόφιλο δισκίο

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ):

Μόσχοι: Για την πρόληψη της παραγρίπης - 3 (PI-3), της ιογενούς διάρροιας (BVD), και της πνευμονίας από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (BRS).

Ενήλικα Βοοειδή: Για την πρόληψη της ιογενούς διάρροιας (BVD).

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δεν έχουν αναφερθεί.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:

Βοοειδή.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση.

Χορηγήστε μία δόση (3 ml) με ενδομυϊκή έγχυση στους μύες του τραχήλου ή με υποδόρια έγχυση.

Μόσχοι: Εμβολιάστε με μια δόση. Επανεμβολιάστε 21 - 30 ημέρες αργότερα, ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολύ νεαρών μόσχων. Χορηγήστε αναμνηστική δόση μία φορά το χρόνο.

Αγελάδες: Εμβολιάστε με μια δόση. Επανεμβολιάστε 21 - 30 ημέρες αργότερα. Χορηγήστε αναμνηστική δόση μία φορά το χρόνο.

Μοσχίδες: Εμβολιάστε με μια δόση. Επανεμβολιάστε 21 - 30 ημέρες αργότερα, ένα μήνα πριν από την επίβαση. Χορηγήστε αναμνηστική δόση μία φορά το χρόνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

α) Ελέγξτε την ημερομηνία λήξεως.

β) Ανακινείστε πριν τη χρήση.

γ) Εμβολιάστε στο ενδεικνυόμενο σημείο (ενδομυϊκή ή υποδόρια έγχυση).

δ) Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες.

ε) Σε περίπτωση αναφυλακτικών αντιδράσεων, χορηγήστε επινεφρίνη ή παρόμοιο φάρμακο.

στ) Πριν χορηγήσετε το εμβόλιο, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου στους 20-25 °C.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 0 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 °C - 8 °C), προστατευμένο από το φως. Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Διάρκεια ζωής μετά την αραιώση ή την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες (κατά περίπτωση): Όταν το λυόφιλο δισκίο ανασυσταθεί, τότε το εμβόλιο πρέπει να χορηγηθεί εντός 3 ωρών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Δεν απαιτούνται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνιάτρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ:

11-10-2012

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ψυχάρη 3 / 184 53 Νίκαια - ΕΛΛΑΣ

Τηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: greece@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com