

Το spinosad είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση φυλλοφάγων καμπιών. Το spinosad δρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίηση τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

Αριθμός Άδειας: 3753

Εγγυημένη σύνθεση:

Spinosad 2,4 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 97,2% β/β

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 848/2002

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρακευής φυλλοτοκού υγρού: Συσκευασία με ενσωματωμένο δοσομετρητή: - Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν την χρήση. - Ξεβιδώνετε το καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά. - Για να ρίξετε την επιθυμητή δόση του σκευάσματος στο φυλλοτοκό δοχείο χρησιμοποιείτε το δοσομετρικό δοχείο που θα βρείτε ενσωματωμένο στη συσκευασία. - Ξεπλύνετε το δοσομετρικό με λιγό νερό που θα το ρίξετε στο φυλλοτοκό σας δοχείο και βάλτε το στη θέση του αφού βιδώσετε ξανά τη συσκευασία, για περαιτέρω χρήση.

Φάσμα δράσης:

Φυτώρια καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων (Υ): Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πιτυοκάμπη, Λυμάντρια: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,4-1 λίτρα /m². Εφαρμογή μετά την άνθηση. Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται ΒΒCH 70-90. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 30 ημέρες.

Αγκυρά(Υ): Πράσινο οσκούληκη, Θρίπας, Ασημένιος σκόρος, Κάμπια αγκινάρας: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,3-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 11-59. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες.

Λάχανο(Κραμπή), Λαχανάκι Βρευκέλλων, Μπρόκολο, Κουνουπίδης Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Θρίπες, Πιερίδα, Μαμέστρα: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 11-49. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.

Αγγούρι(Υ,Θ), Αγγούρι(Θ), Κοκοκούάκι(Υ,Θ), Πεπόνι(Υ,Θ), Καρπούζι(Υ,Θ), Κολοκούθα(Υ,Θ): Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πράσινο οσκούληκη, Σποντόπτερα, Θρίπες: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,3-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 14-89. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Καλλωπιστικά ανθοφόρα ή Πράσινα (Θ): Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πιτυοκάμπη, Λυμάντρια, Θρίπες: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,4-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 10-85. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Αρωματικά φύτα και Βρώμα ανθύ (Υ) (Βασιλικός, Σέλινο, Ανθρώπινος, Εστραγκός, Φασκόπιτο, Θυμάρι, Σχινόπρασος, Δαφνή, Σέλερι, Δεντροβίβανο): Μαρόύλια και άλλες σαλάτες (Υ,Θ), Πλατάνιφύλλο Αντιό, Αντοκτρίβαλο, Ρόκας Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πράσινο οσκούληκη, Σποντόπτερα, Θρίπες: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 11-49. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Φράουλα (Υ): Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πράσινο οσκούληκη, Σποντόπτερα, Δροσοφύλα, Θρίπες: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 14-89. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Φασόλι και Αράκας χωρίς λωβό, φρέσκος (Υ,Θ): Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πράσινο οσκούληκη, Σποντόπτερα, Πυραλίδα: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,4-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 11-79. Στις εφαρμογές θερμοκρασίας ΒΒCH 15-89. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Γλυκό καλαμπόκι: Πράσινο οσκούληκη, Πυραλίδα, Σεζάμια: 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,4-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 14-75. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 21 ημέρες.

Πιπερές(Υ,Θ), Γλυκοπιπερές(Υ,Θ): Μπάμιας Κάμπτες λεπιδοπτέρων, Πράσινο οσκούληκη, Σποντόπτερα, Δορυφόρος, Tuta absoluta: 3 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Θρίπες: 4 κ.εκ./1 λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται. Μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 14-89. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Πατάτα: Δορυφόρος: 1,5 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται. Μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης ΒΒCH 19-89. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10ημέρες.

Αρωματικά Φυτά, Φυτά αρωματοποιίας, Καρυκεύματα (βρώμασμα ή μη βρώμασμα): Θρίπες: 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0,2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειάζεται. Μέχρι την συγκομιδή τηρώντας τον χρόνο τελευταίας επέμβασης. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Τομάτα (Υ,Θ), Μελιτάνα (Υ,Θ): Κάμπιες λεπιδοπέρων, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπερα, *Tuta absoluta*: 3 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. **Ορίστες:** 4 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Δορυφόρος: 1.5 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0.2-1 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειαστεί. Μέχρι την συγκομιδή τηρούνται τα χρόνα τελευταίας επέμβασης BBCH 14-89.

Αμπελί (επιτραπέζιες και οινοποιήσμες πουκιλές): Κάμπιες λεπιδοπέρων, Ευδεμίδια, Κογκλίδια, Πυραλίδια, Δροσόφιλα: 2 κ.εκ./λίτρο ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 0.15-0.6 λίτρα /m². Εφαρμογή με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη εάν χρειαστεί μέχρι το στάδιο χρωματισμού των καρπών BBCH 12-85. Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Μην χρησιμοποιείται προϊόντα ανθοκομικών ή πράσινων καλλωπιστικών ή φυτωρίων δέντρων, θάμνων και καλλωπιστικών ως τροφή ή ως ζωτροφή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάσεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι, Γλυκό καλαμπόκι: **14 ημέρες**, Αγκινάρα, Φασολι και Αρακάς με λιόβι, Πατάτα: **7 ημέρες**, Λάχανα, Κουνουπίδι, Λαχανάκια Βρευτέλων, Μπρόκολο, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκοθάκι, Αρωματικά φυτά και βρώσιμα ανθί, Βρώσιμα καρυκεύματα, Φράουλα, Μαρούλια και άλλες σαλάτες, Πεπόνι, Καρπούζι, Πιπεριές Μπάμια, Μελιτάνες, Τομάτα: **3 ημέρες**. Φυτώρια δένδρων και θάμνων, Ανθοκομικά και πράσινα φυτά σε γλάστρες Καλλωπιστικά ανθοφόρα ή πράσινα: **M.E.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούμενις ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητάς: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **5**

Για την αποφυγή αναπούπλης ανθεκτικότητας συνιστήνεται να ακολουθείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών που αναφέρεται στην επικέτα. Συστήνεται η εναλλαγή με άλλα φυτοπροστατευτικά πριόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να εφαρμόζεται σε στεγνά φύλλα.

Επιρροθέτες οδηγίες για φραστέχνες χρήσης: - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.. - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην φεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον φεκασμό.. - Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.. - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Μέχρι να έχει πλήρης στεγνώσει το φεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: ---

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην αδειάζετε τη συσκευασία, και το νέρο του ξεπλύματος του φεκαστήρα, στο νεροχύτη, στις υδρορροές, ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ροής νερού. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών εφαρμόστε το τουλάχιστον **5 μέτρα** μακριά από επιφανεία νερά, (πηγάδια, λιμνούλες, ρυάκια, ποτάμια).

Επικινδύνο για τις μέλισσες: Μην εφαρμόζετε όταν είναι παρόντα έντονα επικονίσσιας όπως μέλισσες ή βομβίνοι.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση στην οποία ήταν ή αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αρέσων αιτική συμβουλή. Αφαιρέστε αρέσων τα μοιλυσμένα ρούχα και πλύντε τα παραδίδοντα σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΝΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθρό αέρα. Ζητείστε αιτική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύντε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλεύετε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμέτο. Ξεπλύντε το σώμα με νερό και χορηγήστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλεύετε αρέσων γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθησίες του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του και σε θερμοκρασία περβάλλοντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νέρα του ξεπλύματος τα ρίχνονται στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπαμα, για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία ουλαγής για ανακυκλώση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η υπαρξη ανθεκτικότητας, η τεχνική του φεκασμού, καβύς και όλοι παράγοντες, μπορεί να επηρέασουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώντας το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglu Cyprus Ltd.,
Τρί: 22815353 - Λευκωσία
www.premier.com.cy
contact@premier.com.cy

Κάτοχος Άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.