

Leimay

Leimay

Μυκητοκτόνο με προληπτική και αντιπορογόνο δράση για την αντιμετώπιση των πρωτογενών και δευτερογενών μολύνσεων του περονόσπορου. Περιέχει τη νέα δραστική ουσία amisulbrom που ανήκει στην νέα ομάδα των QIs και δρά διελασματικά σε πολλά σημεία του βιολογικού κύκλου του μύκητα. Σε βιοχημικό επίπεδο το amisulbrom παρεμποδίζει την μιτοχονδριακή αναπνοή στη θέση Q1 του συμπλόκου III της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η καινοτομία του amisulbrom έγκειται στο γεγονός ότι προσκολλάται στην εσωτερική πλευρά του κυτοχρώματος b αναστέλλοντας την αναγωγή της ουμπικινόνης.

Αρ. Εγγραφής: 3685

Εγγυημένη σύνθεση:

Amisulbrom: 20 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 82,05% β/β

Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύντε δυο (2) φορές με καθαρό νερό.

Φάσμα δράσης:

Πατάτα: Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα / δεκ. και δόση 40-50 κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός από την αρχή σχηματισμού των πλευρικών βλαστών μέχρι την έναρξη της γήρανσης (κιτρίνισμα των φύλλων).

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): **Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*).** Όγκος ψεκ. υγρού 10-100 λίτρα / δεκ. και δόση 37,5 κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός από το στάδιο εμφάνισης της 3ης ταξιανθίας μέχρι την ωρίμανση των καρπών.

Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου): **Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*).** Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. και δόση 40-60 κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός από το στάδιο εμφάνισης της 3ης ταξιανθίας μέχρι την ωρίμανση των καρπών.

Μαρούλι (Υπαίθρου): **Περονόσπορος (*Bremia lactucae*).** Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. και δόση 40-60 κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός από την εμφάνιση του 9ου φύλλου μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού των φυτών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7- 10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά δεκάριο είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. Το LEIMAY εφαρμόζεται με τις πρώτες ενδείξεις κινδύνου περονόσπορου, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις Αμπέλι: 28 ημέρες. Πατάτα: 7 ημέρες. Μαρούλι, Τομάτα, Μελιτζάνα: 3 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: **Ομάδα Τρόπου Δράσης: C4**

Το amisulbrom ανήκει σε νέα χημική ομάδα με νέο τρόπο δράσης και δεν εμφανίζει δασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα ήδη εγκεκριμένα περονόσποροκτόνα. Οι επεμβάσεις να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα επαφής μη εξειδικευμένης δράσης. Να μην γίνονται περισσότερες από 3 διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα.

Συνδυαστικότητα: ---

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις κατάλληλες οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφύγετε να αναπνεύεται σκόνη / αναθυμιάσεις/ αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / εξοπλισμό για την προστασία των ματιών / του προσώπου. Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη **10 μέτρων** στην καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** στις καλλιέργειες της πατάτας, της τομάτας, της μελιτζάνας και του μαρουλιού από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής,** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατείστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως και από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Όροι Πωλήσεων: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίητός του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της άδειας:

Nissan Chemical Europe SAS