

PANTOX SUPER 360

SL (Glyphosate 36%)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε  βλάβες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά τις οδηγίες χρήσης
δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας: 3557

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: glyphosate οξύ 36% B/o (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % B/o, Βοηθητικές ουσίες 58,4 % B/B

Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγκης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Κάτοχος της άδειας:
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15 233,
Τηλ.: 2105578777

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά
- Διανομέας:



**Premier
Shukuroglou**

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,
Τηλ. : 22815353, Λευκωσία,
e-mail: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Αριθ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγής:
Βλέπε συσκευασία



 **Arysta**
LifeScience

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την **οροβάγχη** στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά δεκάριο με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Να μην χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Τρόπος καθαρισμού ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε τον ψεκαστήρα και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Να εφαρμόζεται μόνο του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στον ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: G. • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate. • Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. Να μην επιτρέπεται η είσοδος στα ζώα για τις επόμενες 21 μέρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής- Ζιζάνιο που ελέγχεται - Δόσεις - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά), Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Ελιές: • Για Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Για Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*): 400-600 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Έως δύο (2) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. • Για Πολυετή ζιζάνια (**): Για Αγριάδα (*Cynodon dactylon*): 750-1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Για Βέλιουρα (*Sorghum halepense*), Φτέρη (*Pteridium aquilinum*): 500 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Για Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*): 1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο με κατευθυνόμενο ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Για την Φτέρη η εφαρμογή γίνεται μετά το ξεδιπλωμα της κορυφής. • Για Κύπερη (*Cyperus sp.*): Έως δύο (2) εφαρμογές για την κύπερη ανά καλλιεργητική περίοδο. 1^η εφαρμογή κατά την άνθηση με 600 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη και 2^η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με 500 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη.

Βαμβάκι (***): • Για Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. • Για Πολυετή ζιζάνια (**): Βέλιουρας (*Sorghum halepense*): 500 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης.

Καπνός: Για Οροβάχνη (*Orobancha ramosa*): Έως δύο (2) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη, 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Β) 60 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη, 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά: • Για Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Για Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*): 400-600 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. • Για Πολυετή ζιζάνια (**) (ως ανωτέρω): 500-1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

Ακαλλιεργήτες εκτάσεις: • Για Ετήσια ζιζάνια (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): 150-200 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Για Μολόχα (*Malva sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*): 400-600 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Έως δύο (2) εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. • Για Πολυετή ζιζάνια (**) (ως ανωτέρω): 500-1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη, (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. • Για Ξυλώδεις θάμνους, Βάτα: 500-1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο, όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Για **Υδροχαρή ζιζάνια:** 800-1000 κ.εκ σκ./ δεκ. μέγιστη. Μία (1) **εφαρμογή** ανά καλλιεργητική περίοδο, κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων.

Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα / δεκάριο: 20-40 λτρ./ δεκ. σε όλες τις περιπτώσεις **εκτός του ΚΑΠΝΟΥ** όπου ο όγκος ψεκ. υγρού είναι 30-40 λτρ./ δεκ.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα - άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι - φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολόχες), *Urtica spp.* (τσουκνίδες), *Polygonum spp.* (πολυκόμπι, λαπάτσα), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κυβ. εκ./δεκάριο, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την **αγριάδα**, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 - 30 εκατοστά.
4. Για την **φτέρη** η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.
5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους.
9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
10. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι καλλιέργειες: **7 ημέρες.**

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

PANTOX SUPER 360

SL (Glyphosate 36%)

ZIZANIOKTONO

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. **Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.** Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το **δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401**

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας: 3557

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: glyphosate οξύ 36% B/o (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % B/o, Βοηθητικές ουσίες 58,4 % B/B

Πυκνό διάλυμα (SL)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15 233, Τηλ.: 2105578777

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:



Premier Shukuroglou Cyprus Ltd, Τηλ. : 22815353, Λευκωσία, e-mail: contact@premier.com.cy www.premier.com.cy

Αριθ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγή: 
Βλέπε συσκευασία

 **Arysta**
LifeScience