

SACRON 45 WG

Μυκητοκτόνο τοπικά διασυστηματικό (δισειδυτικό) και επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε αμπέλι, πατάτα και τομάτα υπαίθρου. Δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα.

Εγγυημένη σύνθεση:

Cytochanil 45% β/β

Βοηθητικές ουσίες 54,10% β/β

Εναιωρηματοποιησιμοί κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας: 3796

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, ρίξτε το στο ψεκαστικό και προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά. Συνεχίστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό έως ότου ο αφρός και όλα τα ίχνη του σκευάσματος έχουν απομακρυνθεί.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες)
		γρ./ δεκάριο μέγιστη	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ δεκ.)		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες & επιτραπέζιες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	27	27-54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 3 φύλλων όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13- 85).	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	22	22-44	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 21- 95)	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου – επιτραπέζιες ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	27	27-54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 - 87)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες
Τομάτα (Υπαίθρου - βιομηχανικές ποικιλίες)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	27	27-54	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο του τρίτου πραγματικού φύλλου και έπειτα ανάλογα με την πίεση προσβολής (BBCH 13 - 85)	5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Να χρησιμοποιείται πάντα σε ανάμιξη με προστατευτικά μυκητοκτόνα επαφής διαφορετικού τρόπου δράσης (π.χ. mancozeb, folpet, copper κ.λπ.). 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται. 3. Να αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια. 4. Προσαρμόστε τις δόσεις

ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά δεκάριο. **5.** Πριν από κάθε εφαρμογή να συμβουλευέστε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε αναμειγνυόμενου προστατευτικού μυκητοκτόνου και να συμμορφώνεστε με τη συνιστώμενη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι: **28 ημέρες**, Πατάτα: **7 ημέρες**, Τομάτα υπαίθρου: **3 ημέρες**, Τομάτα βιομηχανική: **10 ημέρες**.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 27. Για αποτροπή ανάπτυξης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας αλλά και για επιμήκυνση της διάρκειας προστασίας λόγω της συνεργιστικής του δράσης συνιστάται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να εφαρμόζεται σε ανάμιξη ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να μην εφαρμόζεται αν το φύλλωμα είναι υγρό (μετά από άρδευση ή βροχή) ή αν αναμένεται βροχή ή παγετός αμέσως μετά τον ψεκασμό ή αν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται, ανεξάρτητα με τη σειρά προσθήκης στο ψεκαστικό διάλυμα, με προστατευτικά μυκητοκτόνα σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης (mancozeb, maneb, βορδιγάλαιο πολτό, folpet κ.α.). Σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούνται οι εγκεκριμένες για κάθε σκεύασμα δόσεις ανά καλλιέργεια/ασθένεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις εφαρμογής και σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ύποπο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβryo. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει cytochanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. *Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε σκόνη ή εκνεφώματα. Πλένετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του [Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα].

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Γενικά: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική αγωγή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, σε κανονική θερμοκρασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες/κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος: UPL Europe Ltd.

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

LE/SACRON45WG/CY/1

