

Senior 75WG

Senior 75WG

Το SENIOR 75WG είναι διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι. Δρα ως αναστολέας του ενζύμου acetolactate synthase (ALS) (οξυγαλακτική συνθετάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων. Η ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων επιβραδύνεται μερικές ώρες μετά την εφαρμογή του οικεύασματος, αν και είναι δυνατόν για διάστημα αρκετών ημερών να μην παρατηρείται εμφανές αποτέλεσμα. Συμπτώματα όπως χλώρωση και νέκρωση εμφανίζονται πρώτα στο πάνω μέρος του μεριστώματος του φυτού. Τα καινούργια φύλλα του άνω τμήματος επίσης μαραίνονται. Στη συνέχεια η επίδραση αυτή διαδίδεται στα υπόλοιπα τμήματα του φυτού. Η οριστική καταπολέμηση των ζιζανίων παρατηρείται σε διάστημα 2-3 εβδομάδων μετά την εφαρμογή, ωστόσο μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Βέλτιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται σε ζιζανία, τα οποία βρίσκονται στην αρχική, ταχεία φάση ανάπτυξης.

Αρ. Εγγραφής: 3469

Εγγυημένη σύνθεση:

Pyroxasulfam: 7,5% β/β

Cloquintocet-mexyl: 7,5% β/β

(αντιφυτοτοξικός παράγοντας)

Βοηθητικές ουσίες: 92,2 % β/β

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm (30 psi), με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 10 - 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά δεκάριο.

Τρόπος παρασκευής Φεκαστικού διαλύματος: Γερίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα οικεύασματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδένοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδένουσα καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός Φεκαστήρα: Για να αποφύγετε ζημιά σε καλλιέργειες εκτός σιτηρών, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται εσωτερικά και εξωτερικά με νερό και απορρυπαντικό όπως παρακάτω: (1) Αμέων μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείς το φεκαστικό μηχάνημα. Αποιασκρύνετε με νερό τη γηγενή οικεύασματος που βρίσκονται εξωτερικά του δοχείου και στις σωληνώσεις χρησιμοποιούντας τουλάχιστον το 1/10 του δύκου του βυτίου και στις συνέχεια αδειάστε εντελώς το βυτίο. (3) Γεμίστε το βυτίο έως τη μέση και προσθέτετε απορρυπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο αμμωνιακό απορρυπαντικό. Ανακυνήστε και ζεπλύνετε τα εσωτερικά τμήματα και τις σωληνώσεις με το διάλυμα. Συμπληρώστε τη δεξαμενή με νερό αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένη και αναδένετε με 15κεπτο. (4) Τα ακριφώδη και τα φίλτρα να απομακρύνονται και να καθαρίζονται ξεχωριστά με τη χρήση απορρυπαντικού. (5) Ξεπλύνετε όλα τα μέρη του βυτίου συμπεριλαμβανούντων των σωληνώσεων και των άλλων τμημάτων του φεκαστικού, τουλάχιστον με νερό ίσο με το 1/10 του βυτίου και αδειάστε τελείς το φεκαστήρα. (6) Για τη διαχείριση των νερών του καθαρισμού ακολουθείστε τη συνήθη πρακτική διαχείρισης φ.φ. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτων πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Σημείωση: Αν είναι δυνατό, για το πλήρες άδειασμα του βυτίου το βήμα 3 πρέπει να παναλμφάνεται πριν συνεχιστεί η διαδικασία.

Φάσμα Δράσης Σιτάρι (Μαλακό, Σκληρό): Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Ετήσια Αγρωστώδη: Ευαίσθητας Αγριοβρύωμα, Αλεπονούρα, Βρύμος, Ηρα. Μετρίων ευαίσθητα Φαλαρίδι. Ετήσια Πλατύφυλλα: Ευαίσθητα Ανθεμίδα, Σινάπι. Μετρίων ευαίσθητα Κολλητοίδια, Χαμομήλι.

Μέγιστη δόση: 20-25 gr. οκ./δεκάριο, και 0γκ Φλεκ. υγρό 10-40 λίτρα/δεκάριο.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Σιτάρι: Με την εμφάνιση 1ου οδελφίου ως την εμφάνιση του 1ου κόμβου, (BBCH 21-31). Ζιζάνια: Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 3-5 φύλλων και για τα πλατύφυλλα από το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (1) Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας προτείνεται η χρήση του επιφανειοδραστικού παράγοντα PG26-2N (Kaytar, Dassoil) με δόση 200 κ.εκ./HL. (2) Σε περιπτώσεις με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού ζιζανίων να εφαρμόζεται η δόση των 25gr. οκ./δεκάριο. (3) Να εφαρμόζεται με άνοιξη και χαμηλή πίεση (2-3 ατμόσφαιρες). (4) Βροχόπτωση μία ώρα μετά την εφαρμογή δεν επιδρά στην αποτελεσματικότητα του SENIOR 75 WG. (5) Να φεκάζεται όταν η απομονωτική θερμοκρασία είναι μεταξύ 8 και 25°C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ο ελεγχός των ζιζανίων μπορεί να καθυστερήσει όμως η τελική αποτέλεσμα δεν θα επιτελεστεί. (6) Αποφεύγετε να φεκάζετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 5°C ή όταν αναμένεται παγητός. (7) Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από οπουδούμενη είδους καταπόνηση, όπως έρισαθι, θερμός αέρας κ.λ.π. (8) Να αποφεύγεται ο φεκασμός των φυτών που είναι υγρά λόγω βροχής ή απομονωτικής υγρασίας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάλεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Σιτάρι: 60 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, ψυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.), όπου αυτό είναι

δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. - Εάν χρησιμοποιήσετε ρυθμιστή ανάπτυξης, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 7 ημέρες πριν ή μετά τη χρήση του SENIOR 75 WG. - Εάν χρησιμοποιήσετε οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν ή μετά τη χρήση του SENIOR 75 WG.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, η επαναστορά των επέμενων καλλιεργειών (ανοιδάτικα οπτρά, καλαμπόκι) μπορεί να γίνει με ασφάλεια μετά από 45 ημέρες από τότε που εφαρμόστηκε το SENIOR 75 WG και έπειτα από επιφανειακή επεξέργασία στα έδαφους σε βάθος μέχρι 10 εκ. Επειτα από την εφαρμογή του SENIOR 75 WG σε οπτρά, υπό κανονικές πρακτικές ομειψιωποράς, οποιοδήποτε καλλιέργεια μπορεί να σπαρθεί ή φυτευθεί την επόμενη οεζήν.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Οι εργάτες να μην εισέρχονται στον φεκασμένο ογρό πριν στεγνώσει το φεκαστικό διάλυμα (6 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους Παραδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, στο οπάρι όπως χλωρώσια ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμις αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες παρατελμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές υγροτερού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες πρέμερας. Έχει παρατηρηθεί φυτοτοξικότητα στο κριθάρι.

Διάληξεις Προφύλαξης Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόωμη φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών. Σε περίπτωση πανειδίου στην καλλιέργεια μετά την φεκασμό, να φοράτε ολόωμη φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Για την προστατέψετε τα φυτά μότούκια, να αφήσετε ζώνη προσασίας 5 μέτρων από τη μία γεωργική ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης διασποράς του φεκαστικού νέφους, κατά 75%. ΜΗ ΡΥΠΑΝΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακού υδάτα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των ουσιοτήματων αποχέτευσης από τις λιθοπτωτικές επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει pyroxulsatum και cloquintocet-mexyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Πρότεινες Βοήθειες - Αντίδοτο: Γενικές συμβουλές: Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή προκαλέστε εμετό εάν ο πάσχων δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού πρέπει να ληφθεί από τον γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Εποικοφεύθετε γιατρό, ΜΗΝ προκαλέστε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ζεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ζεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευθείτε / Εποικοφεύθετε γιατρό (οφθαλμίτα). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΜΑ:** Ζεπλύνετε με άριθμον νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε/βγάλτε μάρεά σας ή τα μολυσμένα ρούχα. Ζεπλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε/Εποικοφεύθετε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το ακένασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική οιφραγμένη συσκευασία του, σε χώρο έρπο, καλά αεριζόμενο, δροσερό (σε θερμοκρασία κάτω από 40°C) και μακριά από το άμεσο ήλιακο φώς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ζεπλένονται υπό πίεση ώτις να τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προπονυμένως με τρύπημα ή ακίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πώλησης: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και οιφραγμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσαφτες εμπειρίες και γνώσεις. Πόλλοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του φεκασμού, καθώς και όλοι παράγοντες, μπορεί να επηρέασουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώντων το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

LE/SENIOR75WG/CY/3