

 **Sequestrene**[®]
138 Fe NK 100 SG

syngenta[®]

Εγγυημένη σύνθεση:

Υδατοδιαλυτός σίδηρος 6%, Χηλικός σίδηρος 5,5%
Ουρικό άζωτο (N) 3%, Υδατοδιαλυτό οξείδιο του
καλίου (K₂O) 15%

Το χηλικό κλάσμα είναι σταθερό σε εύρος pH 4 - 11
Χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Λίπασμα ΕΚ
Λίπασμα NK 3-0-15 με Σίδηρο (Fe)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 20151 Milano

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

 **Premier**
Shukuroglou
Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφυλάξεις:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Μη χρησιμοποιείτε δόσεις μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες, ιδιαίτερα στους φυλλοψεκασμούς.

Εφαρμογή στο έδαφος σύμφωνα με τις οδηγίες δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τα φυτά.

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.

Καθαρίζετε καλά τα δοχεία ανάμιξης και εφαρμογής του SEQUESTRENE. Είναι ελαφρά διαβρωτικό για τα μέταλλα αν μείνει για πολύ σ' επαφή μαζί τους.

Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με πίεση ή τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.

Πρωτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο:

Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.

Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
1401

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

B/SEQFENK/1KG/CY/3

1Kg

138 Fe NK 100 SG
Sequestrene[®] 

Λίπασμα NK 3-0-15 με Σίδηρο (Fe)

Το Sequestrene NK 138Fe αποτελείται από υψηλής ποιότητας χηλικό σίδηρο σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων. Προλαμβάνει και θεραπεύει την έλλειψη σιδήρου (χλώρωση) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, λαχανικά και καλλωπιστικά φυτά.

Το Sequestrene NK 138 Fe, χάρη στην ισορροπημένη περιεκτικότητά του σε σίδηρο EDDHA των κλασμάτων ortho-ortho και ortho-para, προσλαμβάνεται γρήγορα από τα φυτά και έχει μεγάλη διάρκεια δράσης.

Οδηγίες χρήσης:

Οι δόσεις εξαρτώνται από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της χλώρωσης και τη σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ αναπτυγμένα φυτά, για χλωρώσεις (κιτρινίσματα) βαριάς μορφής και για βαριά αδιαπέραστα εδάφη. Οι μικρές δόσεις είναι για μικρά φυτά, χλωρώσεις ελαφριάς μορφής ή για προληπτικές εφαρμογές και για πολύ διαπερατά εδάφη, που απαιτούν πολλά ποτίσματα. Σ' αυτά τα εδάφη συστήνεται αντί μιας εφαρμογής, να γίνονται 3 ή και 4 διαδοχικές εφαρμογές μέσα στη χρονιά συνδυασμένες με τα ποτίσματα.

Για προληπτική χρήση:

Αμπέλια, Ελιές: 10 - 20 g/φυτό. **Μηλοειδή:** 40 - 50 g/φυτό. **Πυρηνόκαρπα:** 60 - 80 g/φυτό. **Εσπεριδοειδή:** 75 - 100 g/φυτό. **Άλλα Καρποφόρα Δέντρα:** 40 - 80 g/φυτό. **Καρποφόροι και Καλλωπιστικοί Θάμνοι:** 10 - 20 g/φυτό. **Φράουλες:** 0,5 - 0,7 g/φυτό. **Δέντρα σε πάρκα και δρόμους:** 50 - 350 g/φυτό. **Λαχανικά υπαίθρου και θερμοκηπίου:** 1 - 5 g/m². **Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά:** 4 - 8 g/m². **Γρασίδια, Χλοοτάπητες και Γήπεδα:** 2-7 Kg/στρέμμα.

Για θεραπευτική χρήση:

Αμπέλια, Ελιές: 30 - 50 g/φυτό. **Μηλοειδή:** 80 - 100 g/φυτό. **Πυρηνόκαρπα:** 100 - 150 g/φυτό. **Εσπεριδοειδή:** 150 - 250 g/φυτό. **Άλλα Καρποφόρα Δέντρα:** 80 - 200 g/φυτό. **Καρποφόροι και Καλλωπιστικοί Θάμνοι:** 30 - 50 g/φυτό. **Φράουλες:** 1 - 1,5 g/φυτό. **Δέντρα σε πάρκα και δρόμους:** 50 - 350 g/φυτό. **Λαχανικά υπαίθρου και θερμοκηπίου:** 1 - 5 g/m². **Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά Φυτά:** 4 - 8 g/m². **Γρασίδια, Χλοοτάπητες και Γήπεδα:** 2-7 Kg/στρέμμα.

Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα φυτά. Σε περίπτωση χλώρωσης μπορεί να διπλασιαστεί η δόση.

Τρόπος Εφαρμογής:

Να κατανέμετε τη δόση έτσι, ώστε να επωφεληθεί όλο το ριζικό σύστημα των φυτών, π.χ.: Διαλύστε τη δόση σε 10-15 κιλά νερό. Ανοίξτε αυλάκι κυκλικό στα όρια της φυλλωσιάς και διανείμετε το διάλυμα ομοιόμορφα. Σκεπάστε το αυλάκι αμέσως και ποτίστε, μετά, κανονικά. Αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε μεμονωμένα φυτά. Σε αδιαπέραστα ή δυσκολοκατέρραστα εδάφη, μπορείτε, για ευκολία, να κάνετε το ίδιο (για δέντρα και μεγάλους θάμνους) με έγχυση στο έδαφος, χρησιμοποιώντας δηλ. λαστό ή ειδικούς εγχυτήρες (2 τρύπες, τουλάχιστον, ανά τετρ. μέτρο).

Σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής εφαρμόστε διαλυμένο το αναγκαίο Sequestrene, ή σε αυλάκι - σε γραμμικές φυτείες - στις δύο πλευρές της κάθε γραμμής, ή σ' όλη την επιφάνεια. Σκεπάστε το αμέσως με σβάρνα ή άλλο μέσο και ποτίστε.

Στα αμπέλια που ξελακκώνονται, εφαρμόστε το Sequestrene, στους λάκκους λίγο πριν την ισοπέδωση του αμπελώνα. Εφαρμογή στο φύλλωμα δεν συστήνεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα: 50 -100 g/100 κιλά νερό (όχι περισσότερο, ιδίως στα χλωρωτικά φυτά). Τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα έχετε όταν η πρώτη εφαρμογή γίνει με την έναρξη της βλάστησης (στα οπωροφόρα μετά την άνθηση). Γενικά ίσως χρειαστούν 3-4 ραντίσματα ανά 15 ημέρες.

Συνδυαστικότητα:

Εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με το Sequestrene.

Συνθήκες Αποθήκευσης:

Στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, και σε θερμοκρασία μέχρι 35° C.

Χρόνος Εφαρμογής:

Στα δενδρώδη φυτά να εφαρμόζετε το Sequestrene στο τέλος του χειμώνα για να επωφεληθούν τα φυτά στο ακέραιο από την παρουσία του. Στα βαριά εδάφη νωρίτερα. Στα φυλλοβόλα, να φροντίζετε να σημαδεύετε από τον προηγούμενο χρόνο τα δέντρα που πάσχουν από έλλειψη σιδήρου (κιτρινο-φυλλία).

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Όροι Πώλησης: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του.

Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του σκονίσματος, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Ο χρήσιμος χρόνος του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Green Dot
Κύπρου

Αριθμ. παρτίδας:
Ημ/νία παρασκευής:

