

Systhane 20EW

Systhane 20EW

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολών).

Αρ.Εγγραφής: 2843

Εγγυημένη σύνθεση:

Myclobutanil 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 79,03% β/β

Εναιώρημα, λαδί σε νερό (EW)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΩΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαραίμενη ποσότητα σκευάσματος αναδέιντας και συμπληρώντε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανήματων: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπεκ δύο έως τρεις φορές ένας όπου απομακρύνεται ο αφρός και τα ορατά υπολείμματα.

Φάσμα δράσης:

Μηλιά - Αχλαδία: Όιδιο (*Podosphaera leucotricha*) 28 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 100 -150 λίτρα/δεκάριο, 42 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Αμπελί (επιτραπές, οινοποιούματος): Όιδιο (*Uncinula necator*) 28 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 110 λίτρα/δεκάριο, 30 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. **Μαύρη στίψη** (*Gignardia bidwellii*) 15-28 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 110 λίτρα/δεκάριο, 30 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 πημέρες εφόσον απαιτείται.

Ροδακινά, Νεκταριά, Βερικοκιά, Δαμασκούνια: Όιδιο (*Sphaerotheca pannos*) 30 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 120 λίτρα/δεκάριο, 36 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο της ανθώσης. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μονίτιλα** (*Monilia sp.*) 25-30 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/δεκάριο, 36 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10ημέρες εφόσον απαιτείται.

Τομάτα (Y.θ), Μελιτά (Y.θ), Πιπεριά (θ): Όιδιο (*Lewinella taurica*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 80 - 100 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Πεπονιά, Καρπούζι (Υπαίθριο): Όιδιο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Αγγούρι, Αγγουράκι (Gherkin), Κοκούκια - κοκούκια (Θερμοκηπίου): Όιδιο (*Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της βλάστησης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Φράουλα (Υπαίθριο & Θερμοκηπίου): Όιδιο (*Sphaerotheca macularis*) 30 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 75 - 100 λίτρα/δεκάριο, 30 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Καρυδιά, Φουντουκάνια: Ανθράκωση (*Gnomonia leptostyla*) 27-5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 150 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Καλλωπιστικά δένδρα, Θάμνοι σε φυτώρια: Όιδιο, Σκωρίαση (*Erysiphae spp.*, *Puccinia spp.*, *Sphaerotheca spp.*, *Drepanopeziza punctiformis*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα) (Υπαίθριο & Θερμοκηπίου): Όιδιο, Σκωρίαση (*Erysiphae spp.*, *Puccinia spp.*, *Sphaerotheca spp.*, *Uromyces spp.*, *Diplacarpus rosea*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/δεκάριο, 37,5 κ.εκ / δεκ. μέγιστη. Ψεκασμός φυλλώματος από την αρχή της ανθώσης. Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατρήσεις:

- Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι αδημίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- Ο όγκος νερού ανά στρέμμα στην Φουντουκιά - καρπούζια πρέπει να προσταρίζεται ανάλογα ώστε η δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 37,5 κ.εκ. ανά δεκάριο.

Η ρήση στην πιπεριά υπαίθρου και στην αγκινάρα θα χρηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΠΓ όταν τα καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs για το myclobutanil σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούνται να ενημέρωσε ήμεσα την αρμόδια αρχή. (Για την πιπεριά υπαίθρου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και τα απαιτούμενα πειράματα αποτελεσματικότητας).

Πιπεριά: Όιδιο (*Lewinella taurica*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 80 - 100 λίτρα/δεκάριο. Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Μέχρι 3 εφαρμογές. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** 3 ημέρες.

Αγκινάρα: Όιδιο (*Lewinella taurica*) 37,5 κ.εκ /100 λίτρα νερό, Όγκος ψεκ. υγρού 80 - 100 λίτρα/δεκάριο. Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Μέχρι 3 εφαρμογές.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Τομάτα (Y.θ), Μελιτάνια (Y.θ), Πιπεριά (θ), Αγγούρι (θ), Καλλωπιστικά-Καλοκαιρινά (θ), Φράουλες (Y.θ), Λεπτονύ (Y.), Καρπούζι (Y.): 3 ημέρες. Ροδακινά, Νεκταριά, Βερικοκιά, Δαμασκούνια: **7 ημέρες**. Μηλιά, Αχλαδία, Αμπελί (επιτραπές, οινοποιούματος): **14 ημέρες**. Καρυδιά, Φουντουκιά: **60 ημέρες**. Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα): Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαιχίστρια ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

Εφαρμόζεται το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενιών. Εφαρμόζεται το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης. Να μην ψεκάζεται εάν αναμένεται βροχόπτωση εντός 6 ωρών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 1) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε επίσημες καλλιέργειες, συνιστάται οι καλλιέργειες που ακολουθούν να περιορίσουν σε: καρότα, λικοτρίψικα (lettuce), ταύματες, πιπεριές, φράουλες και πεπόνια, 2) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν στεγνώσει την φυτοτοξική επιφάνεια.

Στοιχείο φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις καλλιέργειες της μειτίανας, της φουντουκιάς και των καλλωπιστικών (εκτός από τριαντάφυλλα και χρυσάνθεμα) συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση για ελέγχου φυτοτοξικότητας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκεύασμα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότατη δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλωσίες Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην το χρησιμοποιήστε πριν διαβάσετε και κοντανότερα τις οδηγίες προφύλαξης. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία μέσα στομακής προστασία για τα μάτια/ πρόσωπο. Απορρίψετε για ανανέωση συγκεντρώσεις σπαγγοδίδων. Μαζεύτε την χυμένη ποσότητα.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

"Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία (μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια) και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής, λίγο μετά την φεκαριά".

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέστατη ζώνη προστασίας από τη επιφανειακά ύδατα **14 μέτρων** για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα καλλωπιστικά δένδρα, την καρδιά και τη φουντουκιά (πρώμες εφαρμογές).

"Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης."

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους, αν είναι σύνολο και συνεχίστε το ξελύμα.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε μέσων αιτρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την εικέτα. Δώστε λίγο νερό στο άτομο εάν μπορεί να καταπει. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός εάν λάβετε τέτοια οδηγία από το κέντρο δηλητηριάσεων ή τον γιατρό. Μη δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε αιτρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλιετή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας και προστατευμένο από παγετό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ζητούνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξελύμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο φυτοτοξικό διάλυμα. Στη συνέχεια αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν προηγουμένως με τρόπημα ή οχισμό, για τη διασφάλιση της μη περιττώρευτης χρήσης, εναποτίθενται σε οημέα συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παραγόντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώνταν παρασκευάσμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.