

Τοπας 10ΕC

Τοπας 10ΕC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

Αρ. Εγγραφής: 1062

Εγγυημένη σύνθεση:

Penconazole 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,36% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Φάσμα Δράσης Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): **Οίδιο** (*Podosphaera leucotricha*): 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-140 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 71-78, **δόση σκευάσματος 0,25 λτ/HA LWA. 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): **Οίδιο** (*Podosphaera tridactyla*, *Podosphaera pannosa*, *Sphaerotheca pannosa*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 80-150 λίτρα/δεκ., 75 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 71-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12-14 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): **Οίδιο** (*Erysiphe necator*): 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 30 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 53-79. 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

Αγκινάρα **Οίδιο** (*Leveillula taurica*, *Erysiphe cichoracearum*): Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 51-81. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

Φράουλα (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Podosphaera aphanis*): 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 41-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*): 35 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 51-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

Κολοκύθακι (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*): 35 – 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 51-79. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

Πιπεριά (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Leveillula taurica*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 55-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

Μελιτζάνα (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 51-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου): **Οίδιο** (*Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*): 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 21-89. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

Καπνός **Οίδιο** (*Erysiphe cichoracearum*): Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 20-99. 2 εφαρμογές με 10-14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Ανθοκομικά: Τριανταφυλλιά: *Sphaerotheca pannosa*, *Phragmidium sp.*, Μπιγκόνια, Ντάλια, Καλεντούλα, Χρυσάνθεμο, Πελοργόνιο: *Erysiphe sp.*, *Sphaerotheca sp.*, *Oidium sp.*, *Puccinia sp.*, *Puccinia horiana*, *Puccinia pelargonii-zonalis*, Γαρφαλλιά, Ποτεντίλα, Αγγελική: *Puccinia sp.*, *Puccinia sp.*, *Oidium vononimy japon*, Japanese spindle tree: *Oidium sp.*, Αλθέα: *Puccinia sp.*: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 50 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 13-89. 2 εφαρμογές με 7-12 ημέρες μεσοδιάστημα.

Σμέουρα, Βατόμουρα **Οίδιο** (*Podosphaera aphanis*): 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκ., 40 κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη. BBCH 51-97. 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: ** HALWA: 10.000m² έκταση επιφάνειας κόμης.

- **Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι οινοποιήσιμο: **21 ημέρες** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αγκινάρα, Αμπέλι επιτραπέζιο, Καπνός: **14 ημέρες**. Φράουλα, Αγγούρι, Κολοκύθακι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα: **3 ημέρες**. Ανθοκομικά: **Μη εφαρμόσιμο.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

- Στο απέλι και στα μηλοειδή η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μηκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φρούλα, ακινάρα, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα και καλλωπιστικά) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. - Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μηκητοκτόνα DMIs των 50% των συνολικών επεμβάσεων. - Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μηκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μηκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις χρήσεις στα αυθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισηγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

Συνδυαστικότητα: ---

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, να φοράτε βαμβάκερο μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήνετε απέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

“Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.”



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Κατάποση:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. **Εισπνοή:** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. **Επαφή με το δέρμα:** Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυντος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι Πωλήσεων: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίησών του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,
Τηλ: 22815353 – Λευκωσία
www.premier.com.cy
contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ