

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1 ml περιέχει:

Ceftiofur 50 mg/ml (as Ceftiofur Hydrochloride).

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

Ενέσιμο εναιώρημα.

ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ):

Χοίροι και Βοοειδή.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Ενδομυϊκή για τους χοίρους και υποδόρια για τα Βοοειδή.

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση ώστε να επαναφέρετε το προϊόν σε εναιώρηση.

Διαβάστε το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:

Χοίροι: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες.

Βοοειδή: Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 8 ημέρες.

Γάλα: Μηδέν ημέρες.

Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρήση έως και 28 μέρες μετά.

Μόλις ανοιχθεί, χρήση έως την

Παρτίδας:

ΛΗΞΗ:

EFICUR

50 mg/ml Ενέσιμο εναιώρημα για
χοίρους και Βοοειδή¹
Ceftiofur (as Ceftiofur Hydrochloride)

100 ml



ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ):

Οι πενικιλίνες και οι κεφαλοσπορίνες μπορεί περιστασιακά να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Δείτε το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης σχετικά με τις προειδοποίησεις για τους χρήστες.

Το Ceftiofur μπορεί να αποθεί επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της ανάπτυξης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας.

Απόρριψτε τα αχρησιμοποίητα υλικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C.
Μην ψύχετε ή καταψύχετε.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Αρ. Αδ. Κυκλοφορίας: CY00180V

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN

703164-02.0