

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)**

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 34 (Έντυπο 10), ημερομηνίας 13/01/2016 για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή με ημ. 16/07/2015 για τροποποίηση της άδειας με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

την Απόφαση 118.01.15 του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων, για τις διαδικασίες και τα κριτήρια για καθορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ερασιτεχνικής χρήσης και

την αίτηση με αρ. 2815 (Έντυπο 05), ημερομηνίας 29/03/2016 για ανανέωση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την επιστολή του αιτητή για ανανέωση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για ανανέωση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και την αίτηση με αρ. 4073 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DICOTEX**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2932

Ημερομηνία ανανέωσης άδειας:

28/09/2021

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/01/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

Agryta LifeScience Benelux sprl

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

B) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Dicotex

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

1. 2,4-D: 70g/L
2. dicamba: 20g/L
3. MCPA: 70g/L
4. mecoprop-p: 42g/L
Βοηθητικές ουσίες: 79,61% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Benelux sprl., Βέλγιο

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

- Arysta Lifescience Ougree Production Spirl, Βέλγιο
- Arysta Lifescience S.A.S, Γαλλία
- Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II), Ινδία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- Arysta Lifescience Ougree Production Spirl, Βέλγιο
- Arysta Lifescience S.A.S, Γαλλία
- Arysta LifeScience India Limited (EOU-Unit-II), Ινδία
- ΕΛΛΑΓΡΕΤ ABEE, Μάνδρα Αττικής
- K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ABEE
- ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ABEE
- Σ.Ε.Γ.Ε. ABEE
- ΚΑΡΒΕΛΑΣ ABEE
- MAGMA-AGRO AEBE
- Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη με βιδωτό πώμα ασφαλείας	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ. εκ. και 1Λ	HPDE, COEX HDPE/EVOH, PET
2.	Φιάλη με βιδωτό πώμα ασφαλείας εντός χαρτοκυτίου	100κ.εκ., 250κ.εκ., 500κ. εκ.	HPDE, COEX HDPE/EVOH, PET

Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την επανασφάλιση της συσκευασίας

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

- 1. 2,4-D
- 2. dicamba
- 3. MCPA
- 4. mecoprop-p

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

- 1. 96% (β/β) min
- 2. 88% (β/β) min
- 3. 94% (β/β) min
- 4. 90.5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

2,4-D: DowAgroSciences UK

MCPA, Mecoprop-p: Nufarm UK Limited

Dicamba: BASF Γερμανίας

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

2,4-D: Dow Chemical Company, USA

MCPA, Mecoprop-p: Nufarm UK

Dicamba: Saltigo GmbH, Γερμανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγροστωδών. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους μεριστωματικούς ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών.

Το Dicotex διακόπτει την ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη διαδικασία ανάπτυξης νεκρώνοντας τα ζιζάνια.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής: **Ψεκασμός φυλλώματος**

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίζουμε το ψεκαστικόδοχείο με λίγο νερό. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συστήνεται το ξέπλυμα του ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

5. Φάσια Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός / Ασθενεία / Ζιζάνιο που ελέγχεται	Δόσεις	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	
		Κ.εκ. / 1 λίτρο ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (Κ.εκ. / m ²)	Κ.εκ. σκ./m ² μέγιστη
Πλατύφυλλα ζιζάνια	<p>Χλοοτάπητες αγρωστωδών</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τριφύλλια (<i>Trifolium sp.</i>) - Αγριοράδικα (<i>Taraxacum sp.</i>) - Ρανούνκουλος (<i>Ranunculus sp.</i>) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum sp.</i>) - Καρδαμίνα (<i>Cardamine sp.</i>) - Στελάρια (<i>Stellaria media</i>) - Περδικούλι (<i>Anagallis arvensis</i>) - Αγριοκαρότο (<i>Daucus carota</i>) - Κεράστιο (<i>Cerastium sp.</i>) - Ζωχός (<i>Sonchus sp.</i>) - Γαϊδουράγκαθο (<i>Carduus sp.</i>) - Κίρσιο/Ασπράγκαθο (<i>Cirsium sp.</i>) - Πεντάνευρο (<i>Plantago sp.</i>) - Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>, <i>Senecio jacobaea</i>) - Αγριομαργαρίτα (<i>Bellis perennis</i>) - Λάπταθο (<i>Rumex sp.</i>) 	<p>Χλοοτάπητες αγρωστωδών</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τριφύλλια (<i>Trifolium sp.</i>) - Αγριοράδικα (<i>Taraxacum sp.</i>) - Ρανούνκουλος (<i>Ranunculus sp.</i>) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum sp.</i>) - Καρδαμίνα (<i>Cardamine sp.</i>) - Στελάρια (<i>Stellaria media</i>) - Περδικούλι (<i>Anagallis arvensis</i>) - Αγριοκαρότο (<i>Daucus carota</i>) - Κεράστιο (<i>Cerastium sp.</i>) - Ζωχός (<i>Sonchus sp.</i>) - Γαϊδουράγκαθο (<i>Carduus sp.</i>) - Κίρσιο/Ασπράγκαθο (<i>Cirsium sp.</i>) - Πεντάνευρο (<i>Plantago sp.</i>) - Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>, <i>Senecio jacobaea</i>) - Αγριομαργαρίτα (<i>Bellis perennis</i>) - Λάπταθο (<i>Rumex sp.</i>) 	<p>100</p> <p>7,5</p> <p>100</p> <p>0,75</p>	<p>- Ψεκασμός φυλλώματος</p> <p>- Δεν εφαρμόζεται πριν το στάδιο του αδελφώματος της χλόης.</p> <p>- Μία εφαρμογή, από Απρίλιο - Σεπτέμβρη</p>

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: **ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ**

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το τελευταίο κούρεμα του χλοοτάπητα και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το επόμενο.
- Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδέλφωμα και εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση.
- Η δραστικότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως).
- Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.
- Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι
- Δεν συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή κοπή.
- Μην χρησιμοποιείται τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα για την παρασκευή κομπόστας
- Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό στο τριφύλλι.
- Τα ψεκασμένα φυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.
- Να μην εφαρμόζεται σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημείο παροχής νερού (ρυάκι, δεξαμενή, λίμνη, πηγάδι), ιδιαίτερα αν το έδαφος είναι επικλινές.

Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες:

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο σε νεροχύτες ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα γεώτρηση.
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) στοράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) στοράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Απαγορεύεται η πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή σε παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 208 Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%.

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικές συμβουλές: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αιμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πταθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εφαρμόστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

P361 Αφαιρέστε / Βγάλτε αιμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P330+P315 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αιμέσως γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C .
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:-

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 28/09/2021

