

References

1. Martin, M (2012) Canine congestive heart failure: an approach to case management. Vet Times 42.03
2. Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. (2019) ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 33(3):1127-1140
3. Freeman LM et al. (1998) Nutritional alterations and the effect of fish oil supplementation in dogs with heart failure. J Vet Med Intern Med 12: 440-448.
4. Slupe JL et al. (2008) Association of body weight and body condition with survival in dogs with heart failure. J Vet Intern Med 22: 561-565.
5. Sakabe S et al. (2007) Omega-3 poly-unsaturated fatty acids prevent atrial fibrillation associated with heart failure but not atrial tachycardia remodelling. Circulation 116: 2101-2109.
6. Smith CE et al. (2007) Omega-3 fatty acids in Boxer dogs with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Vet Intern Med 21: 265-273.
7. Sarrazin JF et al. (2007) Reduced incidence of vagally induced atrial fibrillation and expression levels of connexins by n-3 polyunsaturated fatty acids in dogs. J Am Coll Cardiol 50: 1505-1512.

*Treatment of chronic (home-based) Stage C MMVD

CARDISURE: Cardisure contains pimobendan

Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Denmark
Dechra Veterinary Products A/S is a trading business of Dechra Pharmaceuticals PLC

©Dechra Veterinary Products A/S

June 2021



Cardisure®

Βήμα
βήμα
προστίθενται
τα οφέλη



Cardisure®
Pimobendan

CARING ABOUT
CARDIOLOGY

Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια του σκύλου (CHF)

Περίπου το 10% των σκύλων που προσκομίζονται σε ιατρεία πρώτης γνώμης πάσχουν από καρδιακή νόσο. Η πλειονότητα των περιπτώσεων πάσχει από ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (MMVD) ή λιγότερο συχνά, από διατακτική μυοκαρδιοπάθεια (DCM).

Και οι δύο ασθένειες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, μια κατάσταση για την οποία θεραπεία απαιτεί όχι μόνο την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και μακροχρόνια παρακολούθηση και συνεχείς προσαρμογές της δόσης, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η θεραπεία της ΣΚΑ του σκύλου

Ο κύριος στόχος της θεραπείας της ΣΚΑ του σκύλου είναι η αντιμετώπιση των κλινικών συμπτωμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ΣΚΑ* συνιστούν τη συνδυασμένη χρήση φαρμάκων

Η Πιμοβενδάνη είναι βασικό συστατικό στο θεραπευτικό σχήμα. Είναι ευεργετικό σε περιπτώσεις ΣΚΑ λόγω της διπλής της δράσης:

- 1 Θετική ινοτρόπος δράση για βελτιωμένη συσταλτικότητα χωρίς την αύξηση της ανάγκης του μυοκαρδίου σε οξυγόνο
- 2 Αγγειοδιαστολή για μειωμένη προφόρτιση και μεταφόρτιση, διευκολύνοντας το έργο της καρδιάς



“Διαίρει και βασίλευε” Το Cardisure δίνει λύσεις

Τα δισκία Cardisure περιέχουν πιμοβενδάνη, διαίρονται σε 4 κομμάτια και να είναι εύγευστα. Είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 100 δισκίων 10mg και 2,5mg

Κομμάτι-κομμάτι Το Cardisure προσφέρει:

Διπλή Διαίρεση

Η τεχνολογία SmartTab εξασφαλίζει την εύκολη διαίρεση των δισκίων Cardisure ώστε ο ασθενής να λαμβάνει τη σωστή δοσολογία για το σωματικό του βάρος.

Εύγευστα δισκία

Τα δισκία Cardisure έχουν φυσική γεύση βόειου κρέατος που διευκολύνει την αποδοχή και τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη.

Προσιτό

Το Cardisure είναι διαθέσιμο σε 2 συγκεντρώσεις, παρέχοντας ευελιξία στη δοσολογία για σκύλους όλων των σωματικών βαρών. Καθώς το Cardisure διαιρείται διπλά, η θεραπεία είναι πιο συμφέρουσα ως προς το κόστος. Τα μεγάλα δισκία μπορούν να συνταγογραφηθούν και να διαιρεθούν, καθιστώντας τη θεραπεία προσιτή.

