

Advion Cockroach Gel

Για επαγγελματική χρήση.

Αριθμός Εγγραφής: KY-0060

Εγγυημένη σύνθεση:

Indoxacarb 0, 6% β/β

Βοηθητικές ουσίες 98,86% β/β

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB), σε μορφή γέλης.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Πεδίο εφαρμογής:

Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι (μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία, σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις).

Μέθοδος εφαρμογής: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel).

Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 0,2 έως 0,5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο που αντιστοιχούν σε:

- 2 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών ή σε εξαιρετικά ρυπαρές συνθήκες, όπου κυριαρχούν η Ανατολική και η Αμερικανική κατσαρίδα συνιστάται η εφαρμογή μεγαλύτερης δόσης του σκευάσματος ή
- 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή
- 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ. ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι:

(α) 5 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0,1g περίπου (μικρή σταγόνα).

(β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0,4g περίπου (μεγάλη σταγόνα).

Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή το πλάτος της γραμμής θα είναι 3mm και το βάρος 0,35 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών).

Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του: Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Μη συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.

Φροντίστε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Χρονική διάρκεια αποθήκευσης έως 2 έτη.

Οδηγίες χρήσης:

Έλεγχος κατσαριδών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήση μόνο από επαγγελματίες.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωοτροφών να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές.

Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να τοποθετείται σε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων. Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί έτσι αφαιρείται το δόλωμα. Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50°C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να ελαττωθεί η αποτελεσματικότητά του. Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα γίνει υγρό καθαίρισμα ή ξέπλυμα από βροχή. Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτύων) ώστε να μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τις κατασάριδες που θα έχουν έρθει σε επαφή ή έχουν καταναλώσει το προϊόν. Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους. Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τις κατασάριδες και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Προφυλάξεις:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικετα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικετα πριν από τη χρήση. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης: Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των κατασarıδων σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους.

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης): Νύμφες και ακμαία (Blattodea, Βλαττοειδή). Γερμανική κατασarıδα – *Blatella germanica*, Αμερικάνικη κατασarıδα – *Periplaneta americana*, Ανατολική κατασarıδα – *Blatta orientalis*.

Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

2234 Λατσιά, Λευκωσία

Τηλ.: 22815353

Email: contact@premier.com.cy