

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

	% β/β	% β/ο
Ασβέστιο υδατοδιαλυτό (CaO).....	15,0	20,0
Βόριο.....	0,7	0,9
pH:.....	3 – 4	
Πυκνότητα (g / cc):	1.34 – 1.37	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Βαμβάκι:

Εφαρμογή λίγο πριν την άνθιση.

Κηπευτικά:

Εφαρμόστε κάθε 7-15 ημέρες σε όλη την διάρκεια του βιολογικού κύκλου.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Caos XT είναι ένα προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (20% w/v) που προλαμβάνει και διορθώνει τις ελλειψίες ασβεστίου σε όλες τις καλλιέργειες. Η ειδική σύσταση του, με ενώσεις θειικών λιγνινών και γλουκονικού οξέος, επιτυγχάνει την πλήρη συμπλοκοποίηση του ασβεστίου. Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε βόριο (0,9% w/v) διευκολύνει την μεταφορά του ασβεστίου σε όλο το φυτό, συμπεριλαμβανομένων φύλλων και καρπών, πράγμα που θα ήταν πολύ δύσκολο σε μια απλή μορφή ασβεστίου. Το Caos XT, εξασφαλίζει εξαιρετική ανάπτυξη στις ρίζες, βλαστούς, οφθαλμούς και τους καρπούς και σε κάθε όργανο των φυτών. Τα περιεχόμενα αμινοξέα βοηθούν την αφομοίωση του ασβεστίου από τα φύλλα, καθώς επίσης διευκολύνουν την απορρόφηση του και από τις ρίζες. Τελικά επιτυγχάνεται αύξηση της συνοχής – σκληρότητας των καρπών, άριστη απορρόφηση και κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών σε ασβέστιο, βελτίωση της ποιότητας και της μετασυλλεκτικής αντοχής των καρπών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ




Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Ιορδάνη Σουκιούρογλου 4, Λατσιά 2234, Λευκωσία.
Τηλ.: 22815353

CAOS XT

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 15%, ΒΟΡΙΟΥ 0,7%

Αρ. Εγγραφής: 2533



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΛΙΤΡΟ ■ 5 ΛΙΤΡΑ X 20 ΛΙΤΡΑ ■
Αρ. Παρτίδας: 2001101 Ημ. Παραγωγής: 10/11/2021 Ημ. Λήξης: 3 χρόνια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Κρατήστε το μακριά από παιδία.
- Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα και ποτά.
- Χρησιμοποιήστε γυαλιά, γάντια και κατάλληλα ρούχα.
- Μην το αδειάζετε σε λίμνες, σε (τεχνητές λίμνες) δεξαμενές ή στο περιβάλλον.
- Το δοχείο να διατηρείται ερμηνεικά κλεισμένο.
- Διατηρείται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρείτε μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Εσπεριδοειδή & Οπωροφόρα δένδρα: Ξεκινήστε την εφαρμογή στον σχηματισμό των πρώτων φύλλων ή οφθαλμών, επαναλάβετε κάθε 7-15 ημέρες.

Αμπέλια-Ελιές: Κάθε 7-15 ημέρες από την ανθοφορία μέχρι την ανάπτυξη των καρπών.

Πατάτες: Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των κονδύλων, ειδικά σε αμυώδη εδάφη και στο τέλος του βλαστικού σταδίου για την πρόληψη της νέκρωσης του εσωτερικού των κονδύλων.

Διαφυλλική Εφαρμογή: 100-300 ml ανά 100 λίτρα Νερού. (2-8 εφαρμογές) ανάλογα με την καλλιέργεια, τις συνθήκες περιβάλλοντος και του εδάφους.

Εφαρμογή από το έδαφος:

Κηπευτικά 0,25-1 λίτρο ανά δεκάριο (κάθε 15 ημέρες).

Εσπεριδοειδή, Ελιές, και Οπωροφόρα:

0,5 – 1,5 λίτρα ανά δεκάριο (κάθε 15 μέρες).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ



Agroindustrial Kimitec S.L.
MAAVI Innovation Center: Paraje Cerro de los Lobos s/n,
04738 Vícar, Spain | Phone: + 34 950 34 69 09 | kimitec.com

