

Cuproxat Flowable

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας: 962

Ανόργανο μυκητοκτόνο
επαφής με προστατευτική δράση

Εγγυημένη σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός: 19% β/ο
(σε μορφή τριβασικού θειικού γαλκού)
Βοηθητικές ουσίες: 72,30% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)



L/CUPROXAT/5L/CY/5/1



5 Λίτρα



**Premier
Shukuroglou**

Τηλ.: 22815353, Λευκωσία - www.premier.com.cy - E-mail: contact@premier.com.cy

ΠΡΟΖΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος Εφαρμογής:

Τρόπος παρασκευής φυκελαϊκού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του φυκελαϊκού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του νερού αναθεωρώντας και πάλι τη φεκαλίτιδα για να υπολόγεται νερό ανάλογα των συνθηκών της ανάλυσης.

Ομάδα Δράσης: ΣΠΕΡΙΔΙΟΙΔΕΙΑ (Προστακιά, Λεμονιά, Κίτρινη, Κρέμει φυτό). **Φυτέοφθορα καρπών** (*Phytophthora* spp.), **Κορυμφοθήρα** (*Phoma tracheiphila*), **Σεπορίαση** (*Sepotaria* sp.), **Προσβολή κλειδικών, φύλλων και τρυφών** (*Pseudomonas syringae*): Δόση 400 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 800 - 1000 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 200-250 λίτρα / δέκ. Συστήματα 2 ψεκασμού σε μείγναι διάστημα ξεκινώντας από το τέλος Οκτωβρίου. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΑΚΡΟΘΥΡΙΑ** (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά): **Σεπορίαση** (*Sepotaria* sp.), **Εξώσκαος** (*Lathyrus deformans*). **Πολυστήματα** (*Polystigma ochroleucum*), **Σκωρίαση** (*Puccinia pini spritiae*), **Ανθράκωση** (*Gnomonia erythrostoma*): Δόση 420 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 420 - 620 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 100-150 λίτρα / δέκ. Ψεκασμοί φθισιούρου χεσίμου την περίοδο του λήθαργου. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΜΗΘΙΟΙΔΕΙΑ** (Χηλοδία). **Φυκελάδο** (*Venturia pinna*), **Σεπορίαση** (*Sepotaria* sp.), **Φαία σήψη** (*Sclerotinia laxa*) **Βακτηρίαση** (*Pseudomonas syringae*): Δόση 550 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 550-1000 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 100-180 λίτρα / δέκ. Χεσίμετροι ψεκασμού μέχρι και το στάδιο της πρόκλησης κορυφής. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ** (Βερκινιά, Κερασιά, Ροδόχνα, Δασκακινιά). **Φαία σήψη** (*Sclerotinia laxa*): Δόση 445 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 445 - 525 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 100-120 λίτρα / δέκ. Ψεκασμοί φθισιούρου-χεσίμου μέχρι να ανοικτούν τα μάτια. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνια** (*Gycolanium oleaginum*). **Πλοσπόρο** (*Gloeosporium olivarium*). **Καρκίνωση** (*Pseudomonas savastanoi*): Δόση 685 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 1025 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 150 λίτρα / δέκ. Ένας ψεκασμός με τη μικρή δόση στις αρχές φθισιούρου, πριν αρχίσουν οι βροχές και ένας δεύτερος, με τη μεγάλη δόση στις αρχές της άνοιξης. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΑΜΠΕΛΙ** (εμπιστοζία και ανομιπόμοιο σταφυλίδη): **Περωνόσπορος** (*Plasmoma viticola*), **Ανθράκωση** (*Einoae ampelina*). **Βακτηρίαση**: Δόση 550 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 275 - 825 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 50-150 λίτρα / δέκ. Σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και συχνές βροχοπτώσεις την άνοιξη συστήνεται δύο ψεκασμοί: α) λίγο πριν την άνοιξη (σπάνια μορφή) και β) λίγο μετά τη γομιοποίηση. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 2. **ΔΑΧΝΑΚΙΑ** (Παντζάκι, Κρεμμύδι, Τομάτα (Υ+Θ), Πιπέρι (Υ+Θ), Μελτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκασί (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Μπράκολο, Κουνουπίδι, Λαχανό (Κρεμμύδι), Σπανάκι). **Περωνόσπορος** (*Phytophthora* spp., *Pseudoperonospora cubensis*), **Ανθράκωση** (*Colletotrichum* spp.), **Κλαδοσπορίαση** (*Cladosporium* spp.), **Σεπορίαση** (*Sepotaria* sp.), **Βακτηρίαση**: Δόση 400 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 200 - 400 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 50-100 λίτρα / δέκ. Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ψύξιμο των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 150 λίτρα φως. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλ. περίοδο: 3. **ΠΑΤΑΤΑ**: **Περωνόσπορος** (*Phytophthora infestans*), **Ανθράκωση** (*Colletotrichum atenarum*): Δόση 400-580 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 200 - 580 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 50-100 λίτρα / δέκ. Οι ψεκασμοί να αρχίζουν μετά το ψύξιμο των 15 εκ. των φυτών και να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ανά 150 λίτρα φως. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλ. περίοδο: 3. **ΖΑΧΑΡΟΠΥΤΤΑΚΑ**: **Κερκασπορίαση** (*Cercospora beticola*): Δόση 700 κ.ε. / 100 λίτρα φως. Υπόγειο με μέγιστη δόση 280 κ.ε. κ.ε. / δέκ. και Όγκο φως. υγρού 40 λίτρα / δέκ. Προληπτικοί ψεκασμοί ανά 10 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 3.

Παρατηρήσεις: Οι μηδενικές δόσεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμνου την άνοιξη, ιδιαίτερα για την αγχιδιά και οι μεγάλές δόσεις είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του αβθενίου. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν μάτια έχουν εμφανιστεί, το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Σε λαχανικά να αποφευχθούν οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. - Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του αβθενίου. - Στις καλλιέργειες αμπελι, εσπεριδοειδή, αγχιδιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό καλύψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προδοποιήσεων. - **Η συνολική εφοροζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά έκταρο (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χάλκο).**

Περίοδος επιβάρυνσης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασολεκτικές χρήσεις: Ακρόθυρα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά): **28 ημέρες**. Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι, Ζαχαρόπυττα: **21 ημέρες**. Τομάτα Πατάτα, Μελτζάνα, Μελτζάνα Υπαίθρου: **10 ημέρες**. Τομάτα Θερμοκηπίου, Μελτζάνα Θερμοκηπίου, Λαχανικά (Υ+Θ): **7 ημέρες**. Αγχιδιά, Πυρηνόκαρπα: **Μη εφαρμόσιμο** (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

Ειδίως συνθήκες γεωργικής, φυτογυαλείας ή περιβιοτολογικής κατά τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διείσδυση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **M1**

Κορυμνο διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη φεκαλιμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Στοιχεία φεκαλιμότητας, εισαγωγής ποικιλιών και κάθε άλλης παρένέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Γενικά να αποφευχθεί η χρήση του φυτού την άνοιξη. Στο αμπέλι να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Delaware, Rosette, Niagara και Concord και στην αγχιδιά στις ποικιλίες D'Anjou, Comice και Sechel.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με πολλούς άλλους φυκελαϊκούς γίνεται εκτός της εποχής του λήθαργου των δένδρων.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, μην πινετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περύει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτό: Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραιώση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση. **Αντιδοτό:** Πενικιλαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέτρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλη ξέλυμα (ενάερο) του νερού του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο φυκελαϊκό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, απορριπτόμενα σε ειδικά σημεία αλλαγής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Όροι πώλησης:** Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος, μόνο όταν βρίσκεται στην αρχική και φεκαλιμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, είναι καλά δεσμευμένες, αλλά βασίζονται στο πιο πρόσφατες εμπειρικές και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το είδος των ποικιλιών των φυτών, η υπαρχή ανθεκτικότητας, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίηση του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
T.K. 12508, 2250 Λατσία
Τηλ: 22815353

Κάτοχος της Άδειας:
NUFARM GmbH & Co KG

L/CUPROXAT/SL/CV/5/2

