

ΣΥΝΘΕΣΗ

	(% β/β)	(% β/ο)
Ελεύθερα Αμινοξέα	6,0	6,3
Ολικό άζωτο (N)	1,0	1,1
Οργανικό άζωτο (N)	1,0	1,1

Αμινόγραμμα: Λυσίνη, Θρεονίνη, Μεθειονίνη, Αργινίνη, Γλυκίνη, Γλουταμική Κυστεΐνη, Ισοτιδίνη, Αλανίνη, Φανυλαλανίνη, Προλίνη, Ασπαρτικό, Σερίνη, Τυροσίνη, Βαλίνη, Ισολευκίνη και Λευκίνη.

- pH: 7 - 9
- Ειδική βαρύτητα: 1,05 - 1,08 g/cc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Άρδευση: 250 κ.εκ./δεκάριο | Ψεκάσμος: 300 κ.εκ./δεκάριο
 · Έναρξη καλλιέργειας: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
 · Έναρξη της φυσιολογικής φάσης.
 · Κρίσιμες φάσεις: παγετός, ασφυξία ριζών, εχθροί και ασθένειες, φυτοτοξικότητα κ.λπ.

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΕΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ

Νεαρά δέντρα: 5-8 κ.εκ./φυτό
 Ενηλικά δέντρα: 8-10 κ.εκ./φυτό
 Εφαρμόστε μετά τη μεταφύτευση για να αυξήσετε το ποσό της ρίζας.
 Εφαρμόστε μετά τον λήθαργο ή σε στιγμές υψηλών απαιτήσεων, περιόδους στρες ή απώλεια ριζών.

ΜΠΑΝΑΝΑ

Άρδευση: 250 κ.εκ./δεκάριο | Ψεκάσμος: 300 κ.εκ./δεκάριο.
 · Έναρξη καλλιέργειας / μετά τον λήθαργο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
 · Έναρξη της φυσιολογικής φάσης.
 · Κρίσιμες φάσεις: παγετός, ασφυξία ριζών, εχθροί και ασθένειες, φυτοτοξικότητα κ.λπ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Εφαρμογή μετά την μεταφύτευση, η οποία διαχειρίζεται το στέλεχος, με εκτιμώμενη κατανάλωση 50-100 κ.εκ. διαλύματος ανά φυτό. Εφαρμογή μέσω νερού άρδευσης πάντα με άφθονο νερό στην τελική φάση της άρδευσης για καλύτερη χρήση. Χρόνος εφαρμογής Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη μεταφύτευση και η δεύτερη μετά από 7 - 14 ημέρες. Εάν υπάρχουν προβλήματα στο ριζικό σύστημα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το προϊόν.

RHYZOFL

ΜΗ-ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ
 ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
 ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2801

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 6%
 (Οργανικό)

Think Green

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΝΔΕΙΧΜΟΣ ΠΑΡΑ
 ΑΓΡΙΚΟΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΟΛΟΓΙΚΑ



Premier
 Shukuroglou


4 Iordani Shukuroglou str.
 2234 Latsia, Nicosia
 Τηλ.: 22815353
 www.premier.com.cy

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RHYZO FL** είναι οργανικό και μη-ορμονικό ενισχυτής ρίζας σε υγρή μορφή που βασίζεται σε συγκεκριμένα αμινοξέα και βιοδιεγέρτες ριζών, χωρίς φωσφόρο, που προάγει την ανάπτυξη δευτερογενών και τριτογενών ριζών σε κάθε στάδιο όπου η διαδικασία αυτή έχει σημαντική σημασία, όπως μεταφύτευσεις, αναγέννηση κατεστραμμένου ριζικού συστήματος κ.λπ.

Το **RHYZO FL** είναι ένα σκεύασμα που συνιστάται να εφαρμόζεται με μικρόρριζα, δεδομένου ότι δεν περιέχει φωσφόρο, που θα βελτιώσουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και θα διευκολύνουν την εγκατάσταση της μικρόρριζας.

RHYZOFL



Δηλώσεις προσαρμογής ΠΡΟΣΟΧΗ. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P102 Μην αγγίζετε από παιδιά. P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273 Να αποφευχθεί η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P401 Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, πότα και ζωοτροφές. P411+P235 Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C. Διατηρείται δροσερό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής για ειδικά ή επικίνδυνα απόβλητα. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Batch N°: 2004305 Ημ. Παρασκευής: 13/04/2022
 Ημ. Λήξης: 3 χρόνια

Καθαρό Βάρος:
1 λίτρο
 (1.05 κιλά)



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
 Agroindustrial Kimitec S.L.
 MAAVI Innovation Center:
 Paraje Cerro de los Lobos s/n, 04738 Vicar, Spain
 Τηλ: + 34 950 34 69 09 | kimitec.com

ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ