

BUZIN

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ● Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ● Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ● Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. ● Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπληματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ



● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, φόρμα εργασίας και μπότες κατά την εφαρμογή. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

● Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. ● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας με φυσική ανάσχεση 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.,
Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά-Διανομέας:



**Premier
Shukuroglou**

Premier Shukuroglou Cyprus LTD,
Τηλ. 22815353, Λευκωσία

www.premier.com.cy, contact@premier.com.cy

Metribuzin (Μετρίμπουζίν) 70 % β/β ● Ενωιωρηματοποιήσιμο κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Metribuzin 70% β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 27,46% β/β

Αριθμός Άδειας: 3943

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος που ελέγχεται-
Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:

Πατάτα: Για ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτια (Echinochloa crus-galli - ECHCG), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Ήρα (Lolium sp.), Κοινή Πόα (Poa annua), Για Πλατύφυλλα: Βλήτα (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album), Πολυκόμμι (Polygonum aviculare), Σκαρόλαχο (Mercurialis annua), Στύφος (Solanum nigrum), Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Αντράκκα (Portulaca oleracea), Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum), Βερονική (Veronica sp.), Ζωχός (Sonchus oleraceus), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Λάμιο (Lamium sp.), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Μικρή τσουκνίδα (Urtica urens), Πικραλίδα ή Χοιροβότανο (Picris sp.), Χαμομήλι (Matricaria chamomila) με: i) Μέγιστη δόση 40γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα ανά δεκάριο, προφυτρωτικά από τη φύτευση μέχρι 3-4 ημέρες, πριν από το φυτόμα της καλλιέργειας (BBCH 00-07). ii) Μέγιστη δόση 30γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα ανά δεκάριο, μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών έως ότου τα φυτά να έχουν ύψος 5-10 εκ. (BBCH 09-20).

Μεγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες προκειμένες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή. 3. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin: Alica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Oslara, Sebago, Spunta, Agría, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovelix, Colmo, Jaeria, Solist, Natassa, Veronique, Monnalisa, Lusa, Marabelle, Agatha, Fontane, Delicatessa.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυαλείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης C1: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνει εναλλαγή εμβέσεων με ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του

χωραφιού, πατάτα και τομάτα.

ii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους ή του φυλλώματος με 20-40 λίτρα νερό στο δεκάριο. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχμητισμένο. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά, το συντομότερο δυνατόν, μετά τη φύτευση και πριν να φτύνουν τα ζιζάνια και η καλλιέργεια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διάλυστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήσετε το έτοιμο μίγμα στον ψεκαστήρα, εφαρμόστε το αμέσως.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος 2-3 φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σκαούλες, σάκκοι) μαζί με τα κομμάτια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην πατάτα στις συνιστώμενες δόσεις και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα κηρίνιασματός ή λεύκανση στα φύλλα, τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη ή στην απόδοση της καλλιέργειας, σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως Draga, Jaeria, Vivax, Lusa, Agría και Delicatessa.

Τελειαίται εμβέση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πατάτα: 60 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης: κρηνική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

500 γραμ. (gr)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: MTC7003
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 08/2021
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 08/2023