

Το AMISTAR 255C είναι δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των спорιών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των спорιών, ελλοχεύοντας ένα μεγάλο εύρος μικήτων.

Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2994

#### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azoxystrobin 25% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 76,4% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΩΓΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

#### ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μείση. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδύοντας και κατόπιν ρίγνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδύοντας συνεχώς.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εμφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Κολοκυθάκια (Υ&Θ), Αγγούρι (Υ&Θ), Πεπόνι (Υ&Θ): Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium cucumerinum*), Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*)** 100 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80-100 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και για **Ότιδο** (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*) 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 60-80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καρπούζι (Υ&Θ): Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium cucumerinum*), Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*), Ότιδο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κολοκύθα (Υ&Θ): Κλαδοσπορίωση (*Cladosporium cucumerinum*), Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*), Ότιδο (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Τομάτα (Θ): Ότιδο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και για **Αλτερνάρια (*Alternaria solani*), Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80-100 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πιπεριά (Υ&Θ), Μπιμάκι (Υ&Θ): Ότιδο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), Αλτερνάρια (*Alternaria solani*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Αγκινάρα: Ότιδο (*Leveillula taurica*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 50-125 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοστάσις (κεφαλή) (BBCH15-55). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Σπαράγγι: Σκωρίαση (*Puccinia asparagi*), Στεμφύλιο (*Stemphylium* sp.),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρότερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (BBCH41-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μελιτζάνα (Θ): Ότιδο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και για **Αλτερνάρια (*Alternaria solani*), Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*),** 100 κ.εκ.οκ./δεκάριο ή 80-100 κ.εκ.οκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH16-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κρεμμύδια (Ζηρά): Περονόσπορος (*Peronospora destructor*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH14-48). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Φρέουλα (Υ&Θ): Ότιδο (*Podospheia maculans*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών ή τη δεύτερη συγκομιδή που απελευθερώνει καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα (BBCH51-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κυκλάριος (*Puccinia allii*), Περονόσπορος (*Peronospora destructor*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH14-48). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Ρύζι: Πυρικοκωλία (*Pyricularia oryzae*), Εμμηθοσπόριο (*Helminthosporium oryzae*),** 100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της άνθησης (BBCH45-61). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της ταξιανθιάς (BBCH45-51), και η δεύτερη εφαρμογή εάν κριθεί απαραίτητη από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθιάς έχει εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης (BBCH57-61). **Στάρι, Σίκαλη: Σποριοκωλία (*Septoria tritici*), Σκωρίαση (*Puccinia triticina*),** 60-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στέλεχους έως το τέλος της άνθησης (BBCH30-69). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Βρώμη, Κριθάρι: Σποριοκωλία (*Septoria tritici*), Σκωρίαση (*Puccinia triticina*),** 60-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στέλεχους έως την πλήρη έκπτυξη του στέλεχους (BBCH30-59). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πράσο: Περονόσπορος (*Peronospora destructor*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH16-48). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Κρεμμύδια (Χλωρά): Περονόσπορος (*Peronospora destructor*)** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4ου φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιώσει (BBCH14-48). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών: Αλτερνάρια (*Alternaria brassicae*)** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Ρέβα: Αλτερνάρια (*Alternaria brassicae*),** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καρότο: Ότιδο (*Erysiphe* sp.), Αλτερνάρια (*Alternaria dauci*), Σποριοκωλία (*Septoria apicalis*)** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Σελινόριζα: Αλτερνάρια (*Alternaria dauci*), Σποριοκωλία (*Septoria apicalis*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Σέλινο, Οινόκιο (Μαραθόριζα): Αλτερνάρια (*Alternaria dauci*), Σποριοκωλία (*Septoria apicalis*),** 100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου το φύλλωμα θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Ραπανάκι: Αλτερνάρια (*Alternaria dauci*), Σποριοκωλία (*Septoria apicalis*),** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μαιντανόκι: Αλτερνάρια (*Alternaria dauci*), Σποριοκωλία (*Septoria apicalis*),** 80 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του βου πραγματικού φύλλου έως ότου το φύλλωμα θφάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH16-49). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Φασόλια (Ζηρά), Φακές: Σκωρίαση (*Uromyces* sp.), Ασκοχύτωση (*Ascochyta* sp.),** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7ου πραγματικού φύλλου έως ότου το 20% των λαβών έχουν θφάσει το τυπικό τους μέγεθος (BBCH17-72). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μπιζέλια, Αρακάς με και χωρίς Λόξι: Σκωρίαση (*Uromyces* sp.), Ασκοχύτωση (*Ascochyta* sp.),** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση των πρώτων ανδύων έως το τέλος της άνθησης (BBCH51-69). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Κάλε (λαχνιάδα), Κινέζικο Λάχανο: Περονόσπορος (*Hyaloperonospora parasitica*), Αλτερνάρια (*Alternaria brassicae*),** 80-100 κ.εκ.οκ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 20-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος

