



Quelex®

Arylex™ active

ZIZANIOKTONO

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας: 3911

Εγγυημένη σύνθεση:

halauxifen-methyl 11.20% β/β

florasulam 10.31% β/β

Αντιφυτοξικός ποράγοντας: cloquintocet acid 7.26% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 71.23% β/β

**Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διασυστηματικό
ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύψυλλων
ζιζανίων σε σιτηρά.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 γρ.

UFI: YF59-20YK-M00Y-C5AT

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό αφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδροβιούς οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει Urea, polymer with formaldehyde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



**Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία,
www.premier.com.cy, contact@premier.com.cy

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσεται κλειδώμένο, μακριά από παιδά. Μην τρύπε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιούετε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα ματιά / προσώπου. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για ράμπα/ηράστωμα κατά την ανύψει/θύρωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτικη αιμορύνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μην χρηστείτε υγρά και μην προκαλέστε εμέτο εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχρεεί ο αρθρολυκός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε Επισκευέθετε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΛΟΝΗΣ: Μεταφέρετε τον ποθόνιο στον καθρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με διρήνων νερό και αποπόνη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέστε εμέτο. Καλέστε το κέντρο διοπτριάσεων ή γιατρό αν δεν ισχύετε καλά.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 1401
Τηλ. Γραμμή Εκτοκική Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Για να απορύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να απορευτείτε η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για την προστατεύση της φυτικής ζωής προστατεύτε τη φυτική μέση από την επιφανειακά ύδατα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διουσπηματικό ζιζανιοκόνιο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε αιτηρά. Η δραστική συσίτια florasulam παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου σεξεκογλακτικής συνθέσεως (ALS). Η δραστική συσίτια halaxifen-metyl μιμεται τη δράση της αιμητικής ορμόνης των ζιζανίων. Προκαλεί τη διστάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης. Η ανάπτυξη των ζιζανίων δικινάστεται και οδηγούνται στην νέκρωση. Ο κρόνος νέκρωσης πουικλεί από λίγες μέρες έως κάποιες εβδομάδες, ανάλογα με το είδος των ζιζανίων και των καιρικών συνθηκών. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός φαλλώματας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μπικνάνιματος μέχρι τη μίση με νερό. Προσθέστε την αποτάμηση ποσότητας σκευάσματος με σταθερή ροή μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάθευση. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύνοντας καλά και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για να απορύγετε την πρόκληση φυτοτοξικότητας σε καλλιέργειες άλλες των αιτηρών, πρέπει να καθαρίσετε όλο τον εξοπλισμό ψεκασμού μέσα και έξω, σύμφωνα με την ακολουθή διαδικασία:

1. Αμένως μετά τον ψεκασμό οδιέστε το δοχείο του ψεκαστικού τελείων. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό τα εξωτερικά μέρη του ψεκαστικού.
2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας το 1/10 της χωρητικότητας του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο τελείων.
3. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό (τουλάχιστον 10% της χωρητικότητας του δοχείου) και προσθέτετε απορρυπαντικό στην προτεινόμενη αναλογία. Αναδεύνεστε για 15 λεπτά και ξεπλύνετε την ρόβη ψεκασμού και τις σωληνώσεις. Αδειάστε τελείων.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
5. Φίλτρα και μπεκ αφαρόνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό και αποπόνη.
6. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο.

Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που προσφίζονται για την καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

Κάτοχος της Άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 815 53 53
Λευκωσία
www.premier.com.cy
E: contact@premier.com.cy



TM ® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΦΑΙΣΜΑ ΑΡΑΣΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι σκληρό, Σιτάρι μαλακό, Κριθάρι, Σίκαλη): Για την καταπολέμηση πλαστιφύλλων ζιζανίων*. Άδστ σκευάσματος: 2,5-5 γρ./δεκάριο με προσθήκη Surfer στη συνιστώμενη δόση. **Άγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/δεκάριο. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μεταφρωτικά από την αρχή του αδελφώματος έως τη διάγκωση του κολεού του φύλλου σπιραίας. Όπως τα ζιζανία είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. **Μέγιστος πριθρός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι σκληρό, Σιτάρι μαλακό, Κριθάρι, Σίκαλη): Για την καταπολέμηση πλαστιφύλλων ζιζανίων**. Άδστ σκευάσματος: 5 γρ./δεκάριο με προσθήκη Surfer στη συνιστώμενη δόση. **Άγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/δεκάριο. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μεταφρωτικά από την εμφάνιση 3 φύλλων έως τη διάγκωση του κολεού του φύλλου σπιραίας. Όπως τα ζιζανία είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. **Μέγιστος πριθρός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

ΒΡΩΜΗ: Για την καταπολέμηση πλαστιφύλλων ζιζανίων***. **Άδστ σκευάσματος:** 3 γρ./δεκάριο με προσθήκη Surfer στη συνιστώμενη δόση. **Άγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτρα/δεκάριο. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Μεταφρωτικά από την εμφάνιση 3 φύλλων έως τη διάγκωση του κολεού του φύλλου σπιραίας. Όπως τα ζιζανία είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. **Μέγιστος πριθρός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.

Παρατηρήσεις: Η χρήση στα χειμερινά σπιράρια περιλαμβάνει και το τριπόκαλο.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

*Χειμερινά σπιράρια:

α) με δόση 2,5 γρ./δεκ.: Ευαίσθητα: Καλλιτσίδα, Σινάπι άγριο, Χαμομήλι,
β) με δόση 3,75 γρ./δεκ.: Ευαίσθητα: επιπλέον των παραπόνων, Καπνόκορτο,
γ) με δόση 5 γρ./δεκ.: Ευαίσθητα: επιπλέον των παραπόνων, Άδυντη, Αναγαλίδα, Ανθεμίδα, Βερόνικα,
Γλαύκια, Διπλοτίσι, Καψέλλα, Κενταύριο, Λάμιο, Λουθουσιά, Μπιφόρα, Παπαρούνα, Ραπανίδα, Ριβάλφια,
Στελλάρια.
Μετρίως ευαίσθητα: Κίριστα.

**Ανοιξιατικά σπιράρια:

Ευαίσθητα: Αναγαλίδα, Ζωκός, Καλλιτσίδα, Λουθουσιά, Πολύγωνον αναφρικώμενο,
Μετρίως ευαίσθητα: Πολυκύμη.

***Βρώμη:

Ευαίσθητα: Καπνόκορτο, Καλλιτσίδα, Σινάπι άγριο, Χαμομήλι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΝ ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βράυμη: 50 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΚΕΣ ΓΕΩΓΡΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ ή ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ οποίες ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείσμιοι ανθεκτικότητας: Ομόροδο Τρόπου Άριστης: Halaxixifen-methyl: 0, florasulam: 8. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μεθόδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπορώνται την ίδιαν και 1 μήνα μετά την εφαρμογή όλα τα αναδιάτικα στηρίζοντα κατεργασία των εδάφων ή αραβόσιτας μετά από όρση. 2 μήνες μετά την εφαρμογή μπορεί να σπαρεί αριθμότος χωρίς κατεργασία του εδάφους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ οποία ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Όπως έχει στεγνωθεί το πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στη φυτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ή ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΑΥΓΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας έχελεντονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφόνται με τρύπημα, για τη διαφράσιμη της μη περιστέρου χρήση, ενσυστίθενται σε σημεία σύλλογης, για ανακύκλωσή ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχή του συσκευασία, σε χώρο έγρο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.