ADMIRAL 10EC

ADMIRAL 10EC

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωση τους.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: **ΑΡΙΘΜΟΣ ΆΔΕΙΑΣ: 1820**

Pyriproxyfen 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 88,79% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

• ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Φράπα, Γκρέιπφρουτ, Άλλα είδη): Κοκκοειδή (*Saissetia oleae, Lepidosaphes beckii, Insulaspis gloverii, Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Parlatoria pergandei)* με δόση 35-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 225 κ.εκ. σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 200-300 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
• ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Κοκκοειδή *(Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus pyri, Quadraspidiotus spp., Pseudococcus sp., Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Epidiaspis leperii*) με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 30 κ.εκ.σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
• ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Κοκκοειδή *(Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Eulecanium sp., Eulecanium persicae, Epidiaspis leperii)* με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 30 κ.εκ.σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
• ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ: Κοκκοειδή*(Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Eulecanium sp., Eulecanium persicae, Epidiaspis leperii),* με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 30 κ.εκ.σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
• ΕΛΙΑ: Λεκάνιο *(Saissetia oleae)* με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 37,5 κ.εκ.σκ./δεκ.Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς[3].
• ΑΜΠΕΛΙ: Κοκκοειδή *(Pulvinaria vitis, Planococcus citri, Planococcus ficus, Patthenolecanium corni, Heliococcus bohemicus)* με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 60 κ.εκ. σκ./δεκ.Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.
• [ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου)], ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου), [ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (θερμοκηπίου)]: Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 75 κ.εκ. σκ./δεκ.Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δεκ. Δύο (2)[1] εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[2].
• ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου): Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* με δόση 25-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 25 κ.εκ. σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκ. Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[2], 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 8 ημέρες.
• ΒΑΜΒΑΚΙ: Αλευρώδεις *(Bemisia tabaci)* με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/δεκ. Μία (1) εφαρμογή πριν το άνοιγμα των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων.
• ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ανθοφόρα & σε γλάστρα), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΔΕΝΤΡΑ, ΘΑΜΝΟΙ: Κοκκοειδή, Αλευρώδεις *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και μέγιστη 50-112,5 κ.εκ. σκ./δεκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/δεκ. *Κοκκοειδή:* Μία (1) εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. *Αλευρώδεις:* Δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων[2].
• Πεύκα[4]: *Marchalina hellenica*, με δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. Εφαρμογή όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών [4]. Μία (1) εφαρμογή με την προϋπόθεση ότι τη ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.

Παρατηρήσεις:
1. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 ^{0}C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
2. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του ADMIRAL 10 EC.
3. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae.*
4. **Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί** • Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από Συμβούλους Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
• Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το *Marchallina hellenica* μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.
• Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών. Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.
• Περιορισμοί-προφυλάξεις: Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό. Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.

Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου *Marchallina hellenica* σε πεύκα αστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται: **α. Σε κοινόχρηστους χώρους**, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του. **β. Σε ιδιωτικούς χώρους** (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων και εφόσον είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Εσπεριδοειδή: 28 ημέρες. **Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά:** 14 ημέρες. **Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Φράουλα:** 3 ημέρες. **Καλλωπιστικά, Πεύκα:** Μη εφαρμόσιμο. **Λοιπές καλλιέργειες:** Μη εφαρμόσιμο (ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: 7C
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H304Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H336Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P102 Μακριά από παιδιά. P261 Αποφεύγετενα αναπνέετε εκνεφώματα. P270 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
SPo2 Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.
SP1 ΜΗ ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά δέντρα,
- 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα εσπεριδοειδή,
- 25m + ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή,
- 20m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά με ύψος μεγαλύτερο από 50εκ.,
- 10m + ζώνη βλάστησης 10m για τα πυρηνόκαρπα και τα καλλωπιστικά με ύψος μικρότερο από 50εκ.,
- 12m + ζώνη βλάστησης 10m για την ελιά,
- 5m για τα λαχανικά.

***SPe8* Επικίνδυνο για τις μέλισσες**. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών όταν χρησιμοποιείτε δόση μεγαλύτερη από 75 κ.εκ./ δεκάριο ή όταν υπάρχουν μελιτώδη εκκρίματα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: P301+P310 **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P302+P352 **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για να εξασφαλιστεί καλό ξέπλυμα. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από πηγές θερμότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ύπαρξη ανθεκτικότητας, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,
Τηλ 22815353 – Λευκωσία

LE/ADM10EC/CY/5