

TALISMAN

Αρ. Άδειας: 3485



Ζιζανιοκτόνο

**Διασυστηματικό
μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο, για την
καταπολέμηση
αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων
στην καλλιέργεια του
αραβοσίτου.**

Το nicosulfuron δρα
παρεμποδίζοντας το ένζυμο
ALS, συνθέτando του
οξυγαλακτικού.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ**

Εγγυημένη σύνθεση:
Nicosulfuron: 4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

**Κάτοχος της άδειας /
Παρασκευαστής:**



**GALENIKA
FITOFARMACIJA**

Trzaska cesta 515, SI-1351,
Brezovica pri Ljubljani, Slovenija

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Tnλ. 22 81 53 53, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H315 Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5 λίτρα**



**Premier
Shukuroglou**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Σημειώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέυση.

Καθαρισμός ψεκαστικών: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα μετά τον ψεκασμό για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3%. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλωρίνη οικιακής χρήσης.

Να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο.
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνιακής οικιακής χρήσης 3% ανά 100λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος για 10 λεπτά με συνεχή αναδέυση και αδειάστε τελείως το βυτίο ξανά.
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΙΔΕΣ: - **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Βλάτα (*Amaranthus* sp.), **Σκαρολάχανο** (*Mercurialis annua*), **Μουχρίτσα** (*Echinochloa crus-galli*), **Αιματόχορτο** (*Digitaria* spp.), **Σετάρια** (*Setaria* spp.), **Βέλιουρας** (*Sorghum halepense*). - **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** **Λουβουδιά** (*Chenopodium album*), **Αγριοσταμάτι** (*Solanum nigrum*), **Τάτουλας** (*Datura stramonium*), **Πολύγωνο** (*Polygonum convolvulus*), **Πάνικο** (*Panicum miliaceum*). **Μέγιστη δόση 112,5-150 κ.εκ./δεκάριο.**
Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/δεκάριο.
Μια (1) εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος (BBCH 12-18).

Παρατηρήσεις:

*Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση.



UFI CODE: 100H-TA36-630Y-6C0E

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ
ΕΤΗΝ ΚΑΛΩΣΤΕΡΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΙΟΝ



**Green Dot
Κύπρου**



TALISMAN/5LT/CY/1



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Αραβόσιτος: Μ.Ε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: Β

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

α) **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το TALISMAN, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος.

β) **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του TALISMAN και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

γ) **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:** Επιτρέπεται η είσοδος εργατών στον αγρό αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων για βόσκηση για 50 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΡΡΕΪΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Κατά την 1η - 2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμασκιά. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό.

Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

Να μη χρησιμοποιείται στον 'γλυκό καλαμίσκο' και σε καλλιέργειες σε αραβόσιτο που προορίζεται για σπορά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προτείνεται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 - 30°C.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή κανίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακριμόνικο πουκάμισο. Sp/ Μην ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Spε3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στάχους να αφήνετε μια σπείραση ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται σπείραση ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

ΕΥΗ401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P302+352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P305+351+338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P332+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:** Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το κενό υλικό συσκευασίας ξεπλένεται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα. Το νερό του ξεπλύματος προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδεια συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποιότητες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.