

**MAXIM ST (Triclopyr 10% B/B)**

Καθ. Βάρος: 100g (10 Δισκία των 10g)

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση σε Δισκία /δεκ.	Δισκία / 100 λτρ. ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ δεκ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
<b>ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:</b>					
<b>ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ</b> (ποικιλίες: κοινή, είδη Tarocco, Sallustiana, Navellina, Mertin, Moro)	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	1,5 - 3,75 (βέλτιστη δόση 2,5 -3)	---	200 -250	Μετά τη φυσική καρπώπιση και όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 25 χιλιοστά.
	Αποφυγή καρπώπισης.	1,5 - 3,75 (βέλτιστη δόση 2,5)	---	200 -250	Μόλις πριν ή κατά την αλλαγή χρώματος του καρπού.
<b>ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ</b> (ποικιλίες: κοινή, άσπερμες και όψιμες) <i>Κλημεντίνη</i> <i>Κλεμενούλα</i> <i>Σατσούμα, Νόβα - Κλημεντίνη</i>	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	2 - 2,5	---	200 -250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπώπιση και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 20-22 χιλιοστά.
		2,5 - 3,5	---	200 -250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπώπιση και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 18-22 χιλιοστά.
		2 - 3,5	---	200 -250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπώπιση και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 20-24 χιλιοστά
		2 - 3,5	---	200 -250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπώπιση και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 22-26 χιλιοστά.
<b>ΛΕΜΟΝΙΑ</b> (ποικιλίες: κοινή, είδη Femminello, Monachello, Interdonato, Lunario)	Αύξηση μεγέθους καρπού, πρωιμότητα παραγωγής.	1,5 - 3,75	---	200 -250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 22 χιλιοστά (μέση διάμετρος 24-26 χιλιοστά).
<b>ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ</b>	Πρωίμηση ωρίμανσης καρπών, αύξηση μεγέθους καρπών, βελτίωση χρωματισμού καρπών και αύξηση παραγωγής.	---	1,2	80 -120	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 20-24 χιλιοστά και όχι αργότερα.
<b>ΜΗΛΙΑ</b>	Αποφυγή καρπώπισης και αύξηση κόκκινου χρωματισμού σε ορισμένες ποικιλίες.	2	---	30 - 150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
<b>ΑΧΛΑΔΙΑ</b>	Αποφυγή καρπώπισης.	1-2	---	30 -150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
<b>ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:</b>					
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</b> (Πορτοκάλια, Μανταρινιά, Κλημεντίνες)	Διατήρηση κάλυκα, καρπών	---	2	100 λίτρα/τόνο καρπών	Με διαβροχή μετά τη συγκομιδή.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Για όλες τις καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκάλια, Μανταρινιά, Κλημεντίνες): Μία (1) εφαρμογή.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης, κυρίως όσον αφορά τη δόση και τον χρόνο εφαρμογής.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:**

- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρινία, Λεμόνια) 120 ημέρες, Πορτοκάλια - χρήση για αποφυγή καρπώπισης: 40 ημέρες, Βερικόκα: 60 ημέρες, Μηλα, Αχλάδια: 21 ημέρες.
- **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρινία, Κλημεντίνες): 3 ημέρες.

**Τρόπος Εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος για τις εφαρμογές πριν τη συγκομιδή και διαβροχή για τις εφαρμογές μετά τη συγκομιδή.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

**Φυτοτοξικότητα:** Το MAXIM είναι φυτοτοξικό προϊόν για τα λαχανικά και τα αμπέλια, γι' αυτό το λόγο αποφυγείτε το προϊόν να έρθει σε επαφή με τις εν λόγω καλλιέργειες. Εφαρμόστε το Maxim σε υγιείς καλλιέργειες, καλά λιπασμένα και αρδευόμενα φυτά. Μην εφαρμόζετε ποτέ το Maxim σε εσπεριδοειδή πριν τη φυσική πώση.

**Συνδυαστικότητα:** Χρησιμοποιείται μόνο του.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**
**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: triclopyr; O

1. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φυσικής καρπώπισης.
2. Μην ψεκάζετε φυτά που έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα και νεαρά φυτά σε φυτώριο, παρά μόνο ενήλικα φυτά.
3. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή έντονος άνεμος.
4. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στην όψιμη εποχή/ εφαρμογή.
5. Εφαρμόστε σε υγιή φυτά, με επάρκεια υγρασίας και λίπανσης.
6. Μην εφαρμόζετε μαζί με κάλιο.
7. Μην εφαρμόζετε σε αχλάδια ποικιλίας Guyot.

8. Στη βερικόκιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας (σχίσιο καρπών, τοξικότητα στο φύλλωμα), μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μεταγενέστερο στάδιο ή σε μεγάλη δόση από τα προτεινόμενα.
9. Ζητήστε τεχνική συμβουλή, σε περίπτωση αμφιβολιών.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκισμό, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιαντρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάνετε χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιαντρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Πλύνετε καλά το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε έμετο. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**