



SULPHUR WG

Micronized Sulphur Afepasa 80WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

SULPHUR WG

Micronized Sulphur Afepasa 80WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αρ. Εγγραφής: 2815

Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Έχει επίσης και ακαρεοκτόνο δράση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Sulphur 80% θ/θ
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% θ/θ

Βρεξίμοι κόκκοι (WG)



1kg



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΒΑΡΣΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δυο-τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό. Επειδή το θείο διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστές πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ): Για **Πίδιο, Άκαρι** (*Eriophyes sp.*), (*Tetranychus urticae*) με δόση 200-500γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 70-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Μέχρι 6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ): Για **Πίδιο, Άκαρι** (*Eriophyes sp.*), (*Tetranychus urticae*) με δόση 200-500γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 70-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Μέχρι 6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΛΕΜΟΝΙΑ Για **Άκαρι** (*Eriophyes sp.*) με δόση 200-250γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 150-200 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθένειών. **Μέχρι 6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΕΛΙΑ: Για **Καννιά** 2με δόση 00-400γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμόστε την άνοιξη, όταν οι βλαστοί φθάσουν το 10% του τελικού μεγέθους.
ΑΜΠΕΛΙΑ (Επιτραπέζια, Οινολαίμα): Για **Πίδιο, Ερίνωση** (*Eriophyes vitis*), (*Tetranychus urticae*) με δόση 200-400γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές όταν έχουμε 5-8 φύλλα ανοιγμένα (από BBCH 15). **Μέχρι 8 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΦΟΥΖΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για **Πίδιο, Ακάρεα, Τετράνυχο** με δόση 200γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.
ΦΡΑΔΥΛΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για **Πίδιο** με δόση 200 - 400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
ΚΑΛΑΠΙΣΤΙΚΑ, ΘΑΜΝΟΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για **Πίδιο, Ακάρεα** με δόση 200-400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **5 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για **Πίδιο** με δόση 200-400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα / δεκ. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή της προσβολής. **6 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.

ΠΑΡΗΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το θείο δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. Μην εφαρμόζετε παραρινέλαιο για 21 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του. Μην εφαρμόζετε στις καλλιέργειες εάν το φρούτο προορίζονται για κονσερβοποίηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Μ.Ε. για όλες τις πιο πάνω καλλιέργειες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: **Ορόδο Τρόπου Δράσης: M2**

- Μην αναμειγνύετε με λάδια, ούτε προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης, ούτε να κάνετε εφαρμογές σε θερμοκρασίες που είναι πολύ υψηλές.
- Μην εφαρμόζετε ορυκτέλαιο (paraffinic oil) κατά τη διάρκεια των 21 ημερών πριν ή μετά τις εφαρμογές θείου.
- Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες των οποίων τα φρούτα προορίζονται για κονσερβοποίηση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστά συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερά για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το νερό μέσα συσκευασίας (σσκιά, σάκoi) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΗΣΗΣ:
Εγγραμμάστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και αφαγιασμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίηση των παρασκευασίων αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΗ:
Πάρτε το άτομο από την χώρα έκθεσής του και αποσυρτέτε κάθε λεπρωμένο ρούχο ή που έχει πιτσιλιστεί.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΘΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε τα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην έραάστε να θηλάτε τους φακούς επαφής.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΘΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σπυοίτι χωρίς τρίψιμο. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο και μην κορηγίστε τίποτα από το στόμα. Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπνοση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Ελέγξτε την αναπνοή. Αν είναι απαραίτητο, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν το άτομο είναι αναισθητο, βάλτε το στο πλάι με το κεφάλι πιο κάτω από το υπόλοιπο σώμα και το γόνατο ημι-αυγισμένο. Εάν είναι απαραίτητο, πηνήστε τον τραυματισμένο σε ένα κέντρο υγείας και πάρτε και την οικεία ή το δοχείο, εάν είναι δυνατόν.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΩΜΕΝΟ. Η επαφή ή/και η κατάποση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει έρσημι έως και θάνατο των μυών, του δέρματος των βλεφαρώγων, τις αναπνευστικές και τις καρδιαγγειακές οδού. Όφικές επιδόσεις σε επίπεδο CNS, κεφαλαλγία, διαταραχές της συνείδησης, αρτηρία, τρέμουλο και σπασμοί. Σε επανοκαθαρισμένη επαφή, οξυμετρική διαταραχή και πνευμονική οξυαδοποίηση. **Θεραπευτικές συμβουλές για γιατρούς και εργαζομένους υγειονομικές περιβαλλουσ:** Σε περιπτώση κατάποσης, απολύμωση πεπτικού συστήματος, σύμφωνα με την κατάσταση της συνείδησης. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ:** ορόφι Ιρρεσχιαιηα. **Συμπτωματική Θεραπεία.**
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΔΙΑΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνεύστε σταγονίδια εκνεφεύματα. Να μην έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. *Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατάλληλες μέσες κατά την εφαρμογή.* *Όι εργατές θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.* Για την προστασία των μηρυκαστικών, να μην εφαρμόζετε κατά τόπους που βόσκουν τα μηρυκαστικά. **Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. **Sp2** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια μίσκωση ελάχιστη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **Sp3** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια μίσκωση ζώνη προστασίας **15 μέτρων** για τα μπλεσθιά, πυρηνόκαρπα, λεμονιά, και καλλιησιατικά φυτά και **5 μέτρων** για την καλλιέργεια της ελιάς.
ΕΥΗ 401 Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
 βλέπε επί της συσκευασίας
 Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
 Τηλ. 22 81 53 53
 Λευκωσία
 E: contact@premier.com.cy
 www.premier.com.cy
 Κάτοχος της Άδειας:
A.F.E.P.A.S.A
Azuferra Y Fertilizantes
Pallares S.A.