

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΤΙΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα ή σχίσμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φάσμα Δράσης (Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά): Για **Κοκκοειδή, Λεκάριο, Κόκκινη ψώρα** και άλλα **Κοκκοειδή** με 50-112,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 κ.εκ. (max) σε 100-225 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ένας (1) **ψεκασμός** με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενεάς, με την έναρξη της καρπώσεως έως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 71-89).

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Για **Κοκκοειδή** με 30-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ένας (1) **ψεκασμός** με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενεάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Για **Κοκκοειδή** με 24-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 24-30 κ.εκ. (max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ένας (1) **ψεκασμός** με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενεάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

ΕΛΙΑ: Για **Λεκάριο** με 30-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5 κ.εκ. (max) σε 100-125 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ένας (1) **ψεκασμός** με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενεάς, από την έκπτυξη των φύλλων μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 09-59).

ΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου): Για **Αλευρώδεις** με 50-112,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κ.εκ. (max) σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμίδων, από την έκπτυξη της ταξιανθίας έως την ωρίμανση του καρπού (BBCH 50-89). **2 ψεκασμοί/10 ημέρες.**

BAMBAKI: Για **Αλευρώδη** με 62,5-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50κ.εκ. (max) σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Ένας (1) **ψεκασμός** με την εμφάνιση της

προσβολής πριν το άνοιγμα των καρυδίων (BBCH 78-79).

Παρατηρήσεις: (1) Η Χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά, **(2)** Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμίδων αλευρώδων είναι σε υψηλή επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του HARPUN. **(3)** Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της *Parlatoria oleae*.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: **Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 7C** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείστε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα που περιέχει δ.ο. pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του HARPUN στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή του HARPUN αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα και το βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό δυο (2) φορές.

Συνδυαστικότητα: ---

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσληπτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή: 28 ημέρες. Μήλια, Αχλαδιά, Ροδακινιά/Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Ελιά: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (πριν την άνθηση). Βαμβάκι: Μη εφαρμόσιμο.

Αγχογυρί (Θ): 14 ημέρες, Τομάτα (Θ): 3 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Φυλάσσεται στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και προστατευμένο από τον παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ. ΠΑΡΤ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ ΛΗΞ-: Βλέπε επί της συσκευασίας

HARPUN®