

LEBRON 0,5GR

LEBRON 0,5GR

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

δρα
στην επιφάνεια
και στο έδαφος

μεγαλύτερη
διάρκεια
δράσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 3967

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Tefluthrin 0,5 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,5 % β/β
Κοκκώδες (GR)



500gr
για

500m²

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση έκθεσης ή αδυσθεσίας, καλέστε το κέντρο δηλητηρίσεων ή ένα γιατρό, εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΩΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά συσκευασίας, μαζί με τα καυτά, ασαφά καταστροφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



UFI Code: 978M-2D0C-UV0M-NFYE



B/LEBRON/500GR/CY/1

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική φυτευτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3 – 5 εκ). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούλκα, Ατομάρια, Άλτες, Σύμφυλα, Τιπουλίδες. Δόση: 1200-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΓΑΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΟΡΓΟ: Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή καραφατιμέ, Διοβρώτικα, Υλέμνια, Σύμφυλα, Τιπουλίδες. Δόση: 1200-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΓΙΑ: Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή καραφατιμέ, Υλέμνια, Άλτες. Δόση: 1200-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή καραφατιμέ, Υλέμνια, Άλτες. Δόση: 1000-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΚΑΡΟΤΟ (Υ): Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή καραφατιμέ, Υλέμνια, Άλτες, Τιπουλίδες, Καροτόρυγα. Δόση: 1000-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) (Τομάτα – Μελιτζάνα – Πεπόνι – Καρπούζι – Λάχανο – Κουνουπίδι – Φύλλα Σέλινου-Σέλερου – Φινόκιο (Μαραθόριζα) – Άλλα Σαλατικά υπαίθρου (Λυκοτριβόλο-Γαιοκάραδο-Κάρδαμο-Ρόκα-Κόκκινό Σινάπι)-Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργείων (συμπεριλαμβανομένης της κράμβης) που συγκαμίζονται μέχρι το στάδιο του θου πραγματικού φύλλου – Γογγύλι – Γουλι – Φασόλι με λαβό – Μπιζέλι με λαβό): Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή καραφατιμέ, Υλέμνια, Άλτες, Μπυλολόνη, Τιπουλίδες, Σαρανταποδαρούσα, Καροτόρυγα, Ceutorhynchus pleurostigma. Δόση: 1500-2000 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΚΑΠΝΟΣ: Σιδηροσκούλκα, Αγροτίδα ή Καραφατιμέ, Τιπουλίδες. Δόση: 1200-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Κευθόρυγχος*, Άλτες*, Σκαθάρι της γύρης*. Δόση: 1200-1500 γρ./δεκάριο. Μία (1) εφαρμογή κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογα του αναμενόμενου επιπέδου προβολής και του ιστορικού της περιοχής.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση στα φύλλα σέλινου περιλαμβάνει και τα φύλλα μάρδαου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των νουμιφιών του εντόμου του *Diatraea virgifera* στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:

α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).

Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμιαία).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Σε περίπτωση επανεισόδου, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του προϊόντος οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, ελαιοκράμβη, καρότο, φυλλώδη και ριζωματούδη και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρων για το βαμβάκι.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 81 53 53
Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ