

PIRIMOR
50WG

ENTOMOKTONO

PIRIMOR
50WG

ENTOMOKTONO

Αρ. Άδειας: 3985

Εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με παράλληλη δράση ατμών για καταπολέμηση των αφίδων. Έχει διελασματική δράση, εισέρχεται μέσα στα φύλλα με περιορισμένη όμως κινητικότητα.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Pirimicarb 50 % B/B
Βοηθητικές ουσίες 47,4% B/B

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

400gr



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια σε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
P304 + P340 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φθορά επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P337 + 313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P301 + P310 + P330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Acronim.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 0-35°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο υεκοαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρίπημα ή σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι οικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν απωυκίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

B/PIRIMOR50WG/400GR/CY/1



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος. Μεγάλη σημασία έχει η καλή διαβροχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το ½ με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να έχει ανακατευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 2 με 3 φορές από όλα τα υπολείμματα, διαλύοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξέπλυνματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Hyalopterus* spp., *Brachycaudus* spp., *Myzus cerasi*, *Myzus* spp.) με δόση 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και μέγιστη δόση 76 γρ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 1 εφαρμογή.
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ για **Αφίδες** (*Dysaphis* spp., *Eriosoma* spp., *Arhis* spp.) με δόση 50-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και μέγιστη δόση 76 γρ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 1 εφαρμογή.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΟΥ: ΦΡΑΟΥΛΑ, ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΣΠΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΣΟΛΑΚΙ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΟ), ΜΠΙΖΕΛΙ, ΦΑΣΟΛΙ ΞΕΡΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΡΙΖΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ, ΧΡΕΝΟ, ΓΟΓΓΥΛΙ, ΓΟΥΛΙ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ για **Αφίδες** (*Myzus persicae* *Arhis* spp.) με δόση 20-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και μέγιστη δόση 75 γρ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: ~ 1 εφαρμογή (Φράουλα, τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, κολοκύθι, σπαράγγι, φασολάκι (με ή χωρίς λαβό), καρότο, ρίζα μαϊντανού, χρένο, γογγύλι, γουλί, παντζάρι, ~ 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες: αγκινάρα, αγγούρι, πεπόνι, κολοκύθα, καρπούσι, κρεμμύδι, σκόρδο, μπιζέλι και φασόλι ξερό).
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ (εκτός από **baby leaf**, **φύλλα σπανακιού** και **παντζαριού**) για **Αφίδες** (*Nasonovia ribisnigri*, *Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με δόση 20-75 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και μέγιστη δόση 75 γρ./δεκάριο. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 1 εφαρμογή.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΦΡΑΟΥΛΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 80 γρ./δεκάριο ή /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 80 γρ./δεκάριο ή /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ (εκτός από **baby leaf**, **φύλλα σπανακιού** και **παντζαριού**), **ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ** για **Αφίδες** (*Nasonovia ribisnigri*, *Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 50 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες.
ΠΑΤΑΤΑ για **Αφίδες** (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Arhis nasturtii*, *Aulacorthum solani*) με μέγιστη δόση 50 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 30 ~ 40 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΣΟΡΓΟ για **Αφίδες** (*Macrosiphum avenae*, *Rhopalosiphum padi*, *Rhopalosiphum maidis*, *Sitobion avenae*) με μέγιστη δόση 40 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20 ~ 40 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογή έως το στάδιο της άνθησης. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για **Αφίδες** (*Macrosiphum avenae*, *Rhopalosiphum padi*, *Rhopalosiphum maidis*, *Sitobion avenae*) με μέγιστη δόση 40 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20 ~ 40 λίτρα/δεκάριο. Εφαρμογή έως το στάδιο της άνθησης. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 50 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
ΗΛΙΑΝΘΟΣ για **Αφίδες** (*Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 50 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ.εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 100 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 1 εφαρμογή.
ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Arhis* spp.) με μέγιστη δόση 100 γρ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/δεκάριο. Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-12 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο όγκο νερού για τον ψεκασμό, συνίσταται να τηρείτε τις δοσολογίες ανά δεκάριο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΕΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Καρότο (Υ), Ρίζα μαϊντανού (Υ), Χρένο (Υ), Παντζάρι (Υ), Γογγύλι (Υ), Γουλί (Υ), Αγγούρι (Υ+Θ), Μπιζέλι (Υ), Φασόλι Ξερό (Υ), Φασολάκια (με ή χωρίς λαβό) (Υ), Αγκινάρα (Υ), Φράουλα (Υ+Θ), Μαρούλι και λοιπές σαλάτες (εκτός από **baby leaf** φύλλα σπανακιού και παντζαριού) (Υ), Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Κολοκύθι (Υ), Πατάτα, Γλυκό καλαμπόκι: 7 ημέρες. Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούσι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Κρεμμύδι (Υ), Σκόρδο (Υ): 3 ημέρες, Φύλλα σέλινου και μαϊντανού (Θ), Μαρούλια και λοιπές σαλάτες (εκτός από **baby leaf** φύλλα σπανακιού και παντζαριού) (Θ): 14 ημέρες. Λιναρόσπορος, Ελαιοκράμβη, Ηλιανθος: 21 ημέρες, Σπαράγγι (εφαρμογή μετά τη συγκομιδή) (Υ): 7 μήνες. Ανθοκομικά, Καλαμπόκι, Σόργο: Μ.Ε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 1Α
Δεν είναι επικίνδυνο για τα αρπακτικά των αφιδών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
P405+P102. Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P201 Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P261 Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ατμοσφαιρικές σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Οι χειριστές θα πρέπει να φοράουν κατάλληλη αλόσωμη φόρμα, κατάλληλα υποδήματα, γάντια και προστατευτική μάσκα προσώπου κατά την ανάμιξη / φόρτωση» «Όταν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ κλειστού τύπου, η χρήση γαντιών περιορίζεται στις εργασίες που υπάρχει δερματική επαφή με ψεκασμένες επιφάνειες, εκτός καμπίνας» P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτές επιφάνειες και τους δρόμους). «Η είσοδος στην ψεκασμένη περιοχή επιτρέπεται μόνο με κατάλληλα γάντια». SPe3 Για να προστατεύσετε τους οργανισμούς ~ μην στόχευα με αφήστε μια απέκαστη ζώνη 15 μέτρων ή μια απέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται 50% μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332 Εμφθάλει σε περίπτωση εισπνοής.
H351 Ύψιστο για πρόκληση καρκίνου.
H410 Παύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ 208 Περιέχει pirimicarb: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI CODE: 7M9M-5D10-RV0H-7X9F

5 290770 007827

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 81 53 53
Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ