

TEXAS

ZIZANIOKTONO

**Το TEXAS
είναι εκλεκτικό
διασυστηματικό
μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για
τον έλεγχο
πλατύφυλλων
ζιζανίων σε σιτηρά.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Εγγραφής: 4022

Εγγυημένη σύνθεση:

florasulam: 0,63 % (β/ο)

2,4-D: 45,25 % (β/ο),

(που ισοδυναμεί σε 30 % β/ο 2,4-D ισοδύναμο οξύ)

Βοηθητικές ουσίες: 54,39 % (β/β)

**Γαλακτώδες αιώρημα
(Suspoemulsion, SE)**

Κάτοχος της άδειας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία

E: contact@premier.com.cy

www.premier.com.cy

5lt



**Premier
Shukuroglou**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών του florasulam που δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξειδογλυκοξυλική συνδεάση, απαραίτητο για την βιοσύνθεση αμινοξέων και το 2,4-0 που δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των ζιζανίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό / δεκ. με ακροφύσια τύπου ακούρας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (30 - 45 psi) υπό συνεχή ανδάνευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, ανδάνευσης συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανδάνευση. Εφαρμόζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανδάνευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Παύσα, για αποτελεσματικότερο καθαρισμό, συνιστάται η εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

1. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
2. Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ. Προσθέστε απορρυπαντικό με βάση οικιακής αμμονίας ή οικιακής κλωρίνης σε συγκέντρωση 0,5%. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με το διάλυμα απορρυπαντικό και αφήστε το για 10 λεπτά. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
3. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΣΙΤΑΡΙ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ), ΚΡΙΘΑΡΙ: Ευαίσθητα ζιζάνια: **Ανθεμίδια** (*Anthemis* sp), **Καψέλλα** (*Capsella bursa-pastoris*), **Αγριοαρμαριότα** (*Chrysanthemum segetum*), **Αναρριχώμενο πολύγωνο** (*Fallaria convolvulus*), **Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα** (*Galium aparine*), **Υψικόνη** (*Hypericum imberbe*), **Χαρομήλι** (*Matricaria chamomilla*), **Κοινά παπαρούνα** (*Papaver rhoeas*), **Άγριο ανάνι** (*Sinapis arvensis*), **Επίσιος ζωάκος** (*Scorolus olereceus*), **Στελλάρι** (*Stellaria media*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*). Μέγιστη δόση 75 εκ. / δεκ. με 0 ηκο ψεκαστικού υγρού 20-40 / δεκάριο.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξη του αδελφώματος μέχρι το δεύτερο κόμβο (BBCH 21-32) και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων των ζιζανίων.

Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιερ. περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες.
2. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν είναι τα ζιζάνια σε κατάσταση στρες.
3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν υπάρχουν δυνατόι άνεμοι στην περιοχή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διακρίνεται ανθεκτικότητα: Ομάδα Τρόπου Δράσης: florasulam: B, 2,4-D: 0

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται ανώτερη ζιζανιοκτονία με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- **ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Στα συνήθη προγράμματα αμειψισποράς δεν υπάρχει περιορισμός για τις επόμενες καλλιέργειες. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μετά τον ψεκασμό, μπορείτε να σπείρετε σιτάρι, κριθάρι, σικαλή, τριτσάκι, βρώμη και καλομηλιά χωρίς κανένα διάστημα αναμονής.
- **ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΓΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405 + P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφύγετε να αναπνεύετε αναθυμιάσεις / αέρια / ατμοσφαιρικές ιαγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

P501 Διέθετε τον περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κατά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφίσσετε μια σφαιρική ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά ακροφύσια.



ΠΡΟΣΟΧΗ



H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική του απορροσιστική συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύματα (το νερό του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα ή σχίσμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποσπώνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρήσετε ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

P362+P364 Βγάλτε τη μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



5 290770 1007612



Green Dot Κύπρου

