



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 4269 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ιταλία και Ελλάδα και

την αίτηση με αρ. 116 (Έντυπο 10), για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας ως προς το φάσμα δράσης (**προσθήκη καλλιέργειας πιπεριάς θερμοκηπίου και εσπεριδοειδών**) και ως προς τη σήμανση του σκευάσματος, με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα και

την αίτηση με αρ. 4713 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και

την αίτηση με αρ. 849 (Έντυπο 09) για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NEXTER 10 SC με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3724

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/04/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/07/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Nissan Chemical Europe S.A.S

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον

κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: NEXTER 10 SC

2. Μορφή: Πυκνό εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: pyridaben: 10 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 90,11% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Nissan Chemical Europe S.A.S

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

- 1.Schirm GmbH Lübeck, Γερμανία
- 2.Arysta LifeScience Europe Africa Middle-East, Γαλλία
- 3.Schirm AG Lübeck, Γερμανία
- 4.Schirm GmbH Schonebeck (Elbe), Γερμανία
- 5.Schirm GmbH, Baar-Ebenhausen, Γερμανία
- 6.Imperiai Chemical Logistics GmbH, Γερμανία
- 7.SBM Formulation, Γαλλία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- 1. Schirm GmbH Lübeck, Γερμανία
- 2. Arysta LifeScience Europe Africa Middle-East, Γαλλία
- 3. Schirm AG Lübeck, Γερμανία
- 4. Schirm GmbH Schonebeck (Elbe), Γερμανία
- 5. Schirm GmbH, Baar-Ebenhausen, Γερμανία
- 6. Imperiai Chemical Logistics GmbH, Γερμανία
- 7. SBM Formulation, Γαλλία
- 8. MAGMA AGRO A.B.E.E, Ελλάδα

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	100 κ.εκ έως 10 λίτρων	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: pyridaben

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Nissan Chemical Corporation

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nissan Chemical Corporation

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση κινητών μορφών ακάρεων και του αλευρώδους σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Έχει ταχεία δράση (knockdown) και μακρά υπολειμματική διάρκεια

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως με καλή διαβροχή των φυτών

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά (CIDSΙ) - Γκρέιπ φρούτ (CIDΡΑ) - Λεμονιά (CIDLΙ) - Μανταρινιά (CIDRE) - Φράπα (CIDGR) - Λιμμετία (Πράσινο λεμόνι) (CIDAF) - Κιτριά (CIDME) - Νερατζιά (CIDAU)	Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus citri - METTCI)	150 – 200	150 – 200	300	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής, από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή BBCH 69 – 83	1
Τομάτα (Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME) Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Τετράνυχος (Tetranychus sp. - TETRSP) Κόκκινος τετράνυχος (Panonychus ulmi - METTUL)	100 – 140	140 – 200	200	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας/άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση BBCH 51-89	1
	Αγγούρι (Θ) (CUMSC) Αγγουράκι για τουρσί (Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Θ) (CUUPG)	Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum – TRIAVA, Bemisia tabaci - BEMITA)	100 – 140	140 – 200	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του πρώτου άνθους μέχρι την πλήρη ωρίμαση BBCH 51-89	

Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, φυτώρια δέντρων και θάμνων (NNNZZ))	Τετράνυχος <i>(Tetranychus sp. - TETRSP)</i> Κόκκινος τετράνυχος <i>(Panonychus ulmi - METTUL)</i> Αλευρώδεις <i>(Trialeurodes vaporariorum – TRIAVA, Bemisia tabaci - BEMITA)</i>	50 – 140 140 200		ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
---	--	---------------------------------------	--	---	----------

Παρατηρήσεις:

1. Στα λαχανικά, η μέγιστη δόση/100 λίτρα νερό θα πρέπει να συνδυαστεί με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση /δεκάριο.
2. Συνίσταται μια εφαρμογή ανά έτος, με καλή διαβροχή των φυτών, με την εμφάνιση των κινητών μορφών ακάρεων (προνύμφες και ακμαία).
3. Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την άνθηση.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου)	3 ημέρες
Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου	Μη Εφαρμόσιμο
Εσπεριδοειδή	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 21A

Το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο. Συστήνεται ο έλεγχος συμβατότητας των εντόμων επικονιαστών με την χρήση του NEXTER10SC.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος αναμονής 24 ωρών από την εφαρμογή του σκευάσματος, για την εισαγωγή εντόμων επικονιαστών στο θερμοκήπιο.

Συστήνεται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων-ακάρων στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, δέντρα και θάμνοι) συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών μετά τον ψεκασμό, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
SPe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα έντομα επικονιαστές στοθερμκήπιο. Συστήνεται ο έλεγχος συμβατότητας των εντόμων επικονιαστών με την χρήση του NEXTER 10 SC. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος αναμονής 24 ωρών από την εφαρμογή του σκευάσματος, για την εισαγωγή εντόμων επικονιαστών στο θερμοκήπιο.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P304 + P340 +P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα με το σκεύασμα ρούχα εργασίας και ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 24/05/2024



Σφραγίδα

(Κωνσταντής Σπανάσης)
Αν. Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας