

Exit Plus Gel

Imidacloprid 2,19%



Βιοκτόνο εντομοκτόνο με δόλωμα γέλης κατά των κατσαρίδων

Ετοιμόρρυπτο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait). Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

ΣΤΟΧΟΣ: (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης): *Blattella germanica* (Γερμανική κατσαρίδα) - Νύμφες, ακμαία. *Blatta orientalis* (Ανατολική κατσαρίδα) - Νύμφες, ακμαία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εσωτερικοί χώροι.

ΜΕΒΩΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές.

ΔΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Χαμηλή προσβολή: 0,2g / m². Υψηλή προσβολή: 0,3g / m², 1 σταγόνα 0,1g έκει διάμετρο 5mm.

Έως 6 εφαρμογές επισίως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παραδείγματα πώα ή κάτω από τα ψυγεία, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το πούρο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές που μπορεί να αποτελέσουν καταψύγιο για τις κατασφίδες. 2) Εάν είναι ορατός ωφαλός ορθρισμός κατασφίδων που υπάρχει υποψήφια υπηρετική προσβολής, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηθεί μόνο λίγες ή μεριμνώνες κατασφίδες, ανατρέξτε στη δύση εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή". 3) Μην εκβιβήτε τις σταγόνες δολώματος στο πλακιά φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ). 4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόζετε το προϊόν επίσιως σε ένα πλαστικό φύλλο.

Οδηγίες χρήσης: 1. Ακολουθίστε τις οδηγίες χρήσης. 2. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες φυσικές εστίες τροφής κατασφίδων (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων...) ώστε η γέλη να αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους. 3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγχετε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατασφίδες αφίνουν εκκρίσεις και κόπρα για την προσελκύσουσα στάση του ίδιου είδους. 4. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν ο εφαρμογής είναι αναποτελεσματική. 5. Για την προστασία των ποντιών, των κατοικιδίων και των θηλαστικών, οι νεκρές κατασφίδες θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή της εφαρμογής σε καθημερινή βάση. 6. Αν το προσβόλιο επιμενεί παρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, επικονιάστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντούώσεων μυσκοτονιών. Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 1) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 2) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ποντιά, κατοικίδια, αργυρικά ζώα και άλλα ζώα μη-στόχους. 3) Αποφύγετε την έκλυση του στο περιβάλλον. 4) Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωτιροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύες που ενδέκεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωτιροφές, ποτά και ζώα.

ΔΙΑΒΕΣΗ: Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του: 1) Μη απορρίπτετε το αχρησιμόποιο προϊόν στα έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε συλληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση. 2) Απορρίψτε το αχρησιμόποιο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα όλα απόβλητα (π.χ. νεκρό έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΒΗΘΙΚΕΥΣΗ: Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτιροφές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες.

Να αποθηκεύεται μακριά από το φώς.

Σημαντικό:

Χρησιμοποίηση εντομοκτόνα με προσοχή. Πριν από τη χρήση, διαβάστε την ετικέτα.

Να τηρείτε τις χρήσεις, τις δόσεις, τις συνήθειες και τις προφύλαξεις που αναγράφονται στη συσκευασία, οι οποίες έχουν καθοριστεί με βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις εφαρμογές για τις οποίες συνιστάται. Η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ορθή πρακτική λαρυγνώντας υπόψη με δίκινη σας ευθύνη όλους τους ειδικούς παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται και είναι πέρα από τον έλεγχο μας (χρησιμοποιούμενα υλικά, συνθήκες εφαρμογής, μετρήματα προϊόντος κ.λπ.). Ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων του που πωλούνται σταν αρχική τους συσκευασία.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε εύκαιρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφράγισμαστε. Ζεψίλεντε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξανθημός: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζεψίλεντε με νερό. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται.

Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid που είναι επικινδύνο για τις μέλισσες.

ΤΗΛ. KENTΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απλώσεις Επικινδυνότητας: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Απλώσεις Προφύλαξης: Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Μαζεψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεστε του περιεχομένου / περιέκτικα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Παρατάξη: Περιέχει 1, 2 -benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλεσει αλλεργική αντιδραση.

UFI: ECDV-Y6K8-490M-5V2U

Κάτοχος της άδειας:

Sharda Europe B.v.B.A, Βέλγιο

Παρασκευαστής:

NITROFARM A.E., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Ο.Τ. 20, Κ35-55, 57022

Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία

E: contact@premier.com.cy / www.premier.com.cy



Premier
Shukuroglou

L/ECDVPLUSGEL/10G/CY/13

BATCH: 240602 - MFD: 02/2024

Περιεχόμενο: 10γρ.