

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΚΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

- ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ.
- ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ.
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΙΖΩΝ.
- ΔΥΣΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.
- ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΙΖΩΝ/ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
- ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.
- ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ/ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Εκχύλισμα φυκιών, 100% *Ascophyllum nodosum*

	% β/β	% β/ο
Αλγινικό οξύ	3,0	3,4
Μαννιτόλη	1,0	1,1
Οξείδιο του καλίου (Κ ₂ Ο) υδατοδιαλυτό	4,0	4,5

pH: 10,0 – 12,0.

Πυκνότητα: 1,11 - 1,15 g/cc.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 67 mS/cm

Τοξικότητα κατά βάρη μέταλλα: Κατηγορία Α. Περιεκτικότητα σε βάρη μέταλλα κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια για την κατηγορία αυτή.

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

"ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ"

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συμβούλιο της 30 Μαΐου 2018 για την βιολογική γεωργία και την επίστημανση βιολογικών προϊόντων.



Premier
Shukuroglou

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Ιορδάνη Σκουκίρογλου 4,
Λατσιά 2234, Λευκωσία.
Τηλ.: 22815353

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 L (1,1 Kg)

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 3 ΧΡΟΝΙΑ



kimitec

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Agroindustrial Kimitec S.L.

Edificio MAAVI Innovation Center

Paraje Cerro de los Lobos s/n, 04738 Vicar, Ισπανία

Τηλέφωνο: + 34 950 34 69 09 | kimitec.com

BIOALGAX

ΥΓΡΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 3353

ascophyllum

Οικολογική πιστοποίηση



INSTRUMENTO PARA
AGRICULTURA ECOLÓGICA



Πρόσιν πιστοποιημένο από την Kiwa Sativa σύμφωνα με το πρότυπο παραγωγής κατάλληλο για βιολογική γεωργία - Reg(EU) 2018/848, προσιστοποίηση



Το BIOALGAX είναι ένα λίπασμα που βασίζεται σε 100% εκχύλισμα φυκιών *Ascophyllum nodosum*. Αποτελεί ενεργή τήνη μορίων που ενισχύουν την ανάπτυξη του φυτού και την ανάπτυξη των ριζών. Περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά μόρια που καθυστερούν τη γήρανση των φυτών και βελτιώνουν την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων. Το BIOALGAX βελτιώνει τη σχέση μεταξύ της ρίζας και του υπέργειου τμήματος του φυτού αυξάνοντας την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Το BIOALGAX ενισχύει επίσης, μέσω μιας άλλης σειράς συστατικών, την αντοχή στο αβιολογικό στρες (βελτιώνει την αντοχή στην ξηρασία κ.λπ.), βελτιώνει την παροχή μακρο- και μικροθρεπτικών συστατικών και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ: 2-4 ml/L.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ: Στάγδην: 200-400 ml/δεκάριο.

Με το Bioalgax, οι επιδράσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενισχύονται, οπότε η δοσολογία αυτών των προϊόντων πρέπει να μειωθεί, ιδίως των προϊόντων με βάση το θείο, τα οποία μπορεί να φτάσουν σε φυτοτοξικά επίπεδα για το φυτό.

Σε τοπική άρδευση, εφαρμόστε το στη μέση της άρδευσης για να ευνοήσετε την ομοιογενή κατανομή του.

Συστάσεις ανά καλλιέργεια:

Κηπευτικά: Εφαρμόστε από τη μεταφύτευση έως την ωρίμανση των καρπών τουλάχιστον 4-5 φορές.

Φράουλες: Στην αρχή της χειμερινής διακοπής, κατά την προανθοφορία, κατά την καρποδότηση και κάθε 15-20 ημέρες μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.

Εσπεριδοειδή: Στην προανθοφορία και στην πτώση των πετάλων.

Ελιά: Εφαρμόστε το πριν και κατά τη διάρκεια της βλάστησης και στην αρχή της αλλαγής χρώματος του καρπού.

Αμπέλι: Από το φύτεμα και μετά, εφαρμόζετε τουλάχιστον κάθε μήνα.

Συμβατότητες: Μην αναμεμιγνύετε με χαλκό ή Fosetyl Al. Αυτό το προϊόν έχει αλκαλική αντίδραση. Συνιστάται η ρύθμιση του pH σε περίπτωση ανάμειξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: 5AF2-U0WT-200V-VX0A

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. P102 + P261 + 270 Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ενεργήματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης. P280 + P302 + P352 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό/προστασία ματιών/προσώπου/αυτιών. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. P321 Απαιτείται ειδική επεξεργασία (βλέπε προδιαγραφές στην παρούσα ετικέτα). P333 + P313 + P362 + P364 Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού ή εξανθήματος: Συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P411 + P235 Φυλάσσεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 35°C. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 Διατηρήστε το σε δροσερό μέρος. P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε δημόσιο σημείο συλλογής ειδίων ή επικινδύνων αποβλήτων.

EU(H208 Περιέχει 1,2-βενζοσουλθαζολ-3(2H)-όνη-1,2-βενζοσουλθαζολιν-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: 2-μεθυλοσουλθαζολ-3(2H)-όνη