

plant food



# IronMax

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ  
CHELATED IRON

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΕ  
CE FERTILIZER

Bio

Δείτε τη  
διαφορά  
σε μια  
βδομάδα  
See results  
within a week

400gr

Αρ. παρτίδας (Batch No) &  
Ημ. Παρασκευής (Man. Date):  
Βλέπε εσωτερική συσκευασία  
See inner packaging

## IronMax

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΕ  
CE FERTILIZER  
Reg. (EU) 2019/1009



Για υγιέστερα φυτά χρησιμοποιείτε  
φυτοκάλυμα της σειράς **My Green Cycle**.  
For healthier plants, use **My Green Cycle**  
potting soils.

Το **IRONMAX** περιέχει χηλικό σίδηρο στη μορφή Fe-EDDHA που απορροφάτε αμέσως και είναι απολύτως αφομοιώσιμος από τα φυτά. Η τροφονομία σιδήρου (κιτρίνισμα) παρατηρείται σε εδάφη με μεγάλη συγκέντρωση ασβεστίου, υψηλή εδαφική υγρασία και σε περιπτώσεις άλλων στοιχείων.

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:**  
**ΑΜΠΕΛΙΑ:** 5γρ. / φυτό κατά τη φύτευση ή 20-50γρ. / κρέμνο με περίπου 10 λίτρα νερό σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια.  
**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινας, Βερικοκίος):** 50-150γρ. / δέντρο με 10-15 λίτρα νερό.  
**ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Αχλαδιές, Μελιές):** 100-300γρ. / δέντρο με 10-15 κιλά νερό.  
**ΕΠΕΡΙΑΕΙΔΗ:** Μικρά: 50-100γρ. / δέντρο. Μεγάλα: 150-250γρ. / δέντρο. Η εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.  
**ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ:** Γενικά 5-8γρ. / δενδρύλλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση.  
**ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ (Γαρβένια, Χρυσάνθεμα, Μπιγκόνια κ.α.):** σε πότ υγρό κύμα ριζτε διάλυμα SUPERIRON 1γρ. / κιλό νερό. Στην Ορτανόια 5 γρ. / λίτρο νερό. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες.  
**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ:** 3-5γρ. / φυτό ή 10-20γρ. / m<sup>2</sup>, καθολικά.  
**ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανίσιες):** 10-20γρ. / φυτό, με το νερό του ποτίσματος.  
**ΚΑΛΛΙΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ:** 50-100γρ. / φυτό, με το νερό του ποτίσματος.  
**ΛΑΧΑΝΙΚΑ:** Ριζοπότισμα με 50-100γρ. διαλύματος 2% (2γρ. / λίτρο νερό), σε κάθε ρίζα, πριν από το πότισμα.  
**ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** (σε όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5γρ. / m<sup>2</sup> εδαφικής επιφάνειας.

**IRONMAX** contains chelated iron in the form of Fe-EDDHA that is immediately absorbed and is completely assimilable by plants. Iron deficiency (yellowing) occurs in soils with a high concentration of calcium, high soil moisture and in excess of other elements.

**RECOMMENDED USES AND DOSAGES:**  
**VINES:** 5g / plant at planting or 20-50g / plant with about 10L of water in a mature crop.  
**STONE FRUITS (PEACH, APRICOT):** 50-150g / tree with 10-15L of water.  
**PEARS, APPLES:** 100-300g / tree with 10-15L of water.  
**CITRUS TREES:** Small: 50-100g / tree. Large: 150-250g / tree. Application is made with 10-25L of water and immediate incorporation.  
**TREE NURSERY:** Generally, 5-8g / tree with 10-25L of water and immediate incorporation.  
**ORNAMENTAL IN POTS (Gardenia, Chrysanthemum, Bigonia, etc.):** in already moist soil, pour SUPERIRON solution 1g / Kg water. In Hydrangea, 5g / L of water. In heavy infestation repeat after 8 days.  
**ROSES:** 3-5g / plant or 10-20g / m<sup>2</sup>, cover application.  
**ORNAMENTAL SHRUBS (azaleas, rhododendrons, hydrangeas):** 10-20g / plant, with watering water.  
**ORNAMENTAL TREES:** 50-100g / plant, with watering water.  
**VEGETABLES:** Root watering with 50-100g of 2% solution (2g / L of water), on each root, before watering.  
**COVER APPLICATION:** (over the whole surface) an average dose of 5g / m<sup>2</sup> of soil surface is recommended.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / INSTRUCTIONS FOR USE

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**  
**Ριζοπότισμα.** Για καλύτερα αποτελέσματα η πρώτη εφαρμογή να γίνει με την έναρξη της βλάστησης (στα ανωρφόρα μετά την άνθηση). Δεν είναι κατάλληλο για καλλέργειες ευαίσθητες στο χλώριο.  
**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**  
Στα δενδρύδια φυτά να εφαρμόζετε στο τέλος του χειμώνα. Στα βαριά εδάφη νεώτερα. Στα φυλλοβόλα, να φροντίζετε να σηματοθεύετε από τον προηγούμενο χρόνο τα δέντρα που πάσχουν από έλλειψη σιδήρου (κιτρίνοφυλλα).  
**METHOD OF APPLICATION:**  
**Through Root system.** For the best results, the first application should be made at the beginning of germination (in fruit trees after flowering). Not suitable for crops sensitive to chlorine.  
**TIME OF APPLICATION:**  
For tree plants, apply at the end of winter. In heavy soils earlier. In deciduous trees, ensure that trees suffering from iron deficiency (yellow leaf) are marked the previous year.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**  
Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κοινά παρασκευάσματα. Συνίσταται να γίνεται μικρή δοκιμή του μίγματος για καλύτερη ασφάλεια.  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**  
Επιν αρχική του συσκευασίας μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία μέχρι 35°C.  
**COMPATIBILITY:**  
Can be combined with all common preparations. It is recommended to do a small test of the mixture for better safety.  
**STORAGE CONDITIONS:**  
In its original packaging away from sunlight and moisture in a well-ventilated area and at a temperature up to 35°C.

Προϊόν της:  
**NITROFARM ΑΕ, Ελλάδα**  
Διανομέας:  
**Premier Shukuroglou Cyprus Ltd**  
Τηλ. 22 81 53 53  
Λευκωσία  
E: contact@premier.com.cy  
www.premier.com.cy

Χρήσιμες συμβουλές για ένα πανέμορφο κήπο,  
θα βρείτε στο [www.premier.com.cy](http://www.premier.com.cy)  
Useful advice for maintaining a beautiful garden  
at [www.premier.com.cy](http://www.premier.com.cy)

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**  
Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 6.0%  
Σίδηρος (Fe) χηλικός [o-a]: 2  
Εύρος pH που εγγυάται επιπλέον σταθερότητα για το χηλικό κλάσμα: 4-9  
Χηλικοί παράγοντες: [o-a] EDDHA και [o-p] EDDHA  
**GUARANTEED COMPOSITION:**  
Iron (Fe) water soluble 6.0%  
Iron (Fe) chelic [o-a]: 2  
pH range guaranteeing permissible stability for the chelating fraction: 4-9  
Chelated agents: [o-a] EDDHA and [o-p] EDDHA

**ΑΠΑΡΧΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**  
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για το μάτι / προστατευτικά υποδήματα.  
P302 + P352: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο νερό. P305 + P351 + P338: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** -επιλύστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φασκιές επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P332 + P313: Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P337 + P313: Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

**PRECAUTIONARY STATEMENTS:** P264: Wash your hands thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection/face protection. P302 + P352: **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. P305 + P351 + P338: **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P332 + P313: If skin irritation occurs: Get medical advice / attention. P337 + P313: If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

POISON CENTER PHONE NUMBER: 1401



**ΠΡΟΣΟΧΗ / WARNING**  
H319 Οφθαλμικός ερεθισμός. Causes serious eye irritation.  
H315 Ερεθισμός του δέρματος. Causes skin irritation.



512907701007841  
B/IRONMAX/400G/CY/1