

SAFRAN

1.8EC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

**Εντομοκτόνο –
ακαρεοκτόνο
στομάχου και επαφής.**
Προκαλεί παράλυση στα
έντομα με αποτέλεσμα το
θάνατο τους από αστία.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. **H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει Cyclohexanol και Butylated Hydroxytoluene.

UFI: 17V8-Y3SF-7N4P-RV58

Αρ. Άδειας: 3186

Εγγυημένη σύνθεση:

Abamectin 1,8 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες 98,2% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Κάτοχος της Άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

**Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά –
Διανομέας:**

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Ιορδάνη Σουκιουρόγλου 4 (πρώην Ολύμπου 4),

Βιομηχανική Ζώνη Λατσιών, Λευκωσία 2234,

Ταχυδρομική Θυρίδα 12508,

Λασιά Λευκωσία 2250, Κύπρος

Τηλ: 22 815 353

contact@premier.com.cy

www.premier.com.cy



**Αρ. Πάρτιδος (Batch No) &
Ημ. Παραγωγής (Man. Date):**
βλέπε συσκευασία



Περιεχόμενο: 5lt



**Premier
Shukuroglou**

L/SAFRAN18EC/5LT/CY/1/2

SAFRAN 1.8EC – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδού, ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής – Εκθρόνισή που ελέγχεται – Δόσεις – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής – Μείγματα αρ. εφαρμογών/ καλλιερ. περίοδο:

ΦΡΑΟΥΛΑ (Θερμοκλίπου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Λυριόμυζα** (*Lyriomyza* sp.) με **δόση** 120 κ.εκ./δεκάριο (max) ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Θερμοκλίπου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Λυριόμυζα** (*Lyriomyza* sp.) με **δόση** 120 κ.εκ./δεκάριο (max) ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 60-150 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 20 ημέρες.

ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκλίπου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*) με **δόση** 75 κ.εκ./δεκάριο (max) ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 60-150 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 20 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ (Θερμοκλίπου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Λυριόμυζα** (*Lyriomyza* sp.) με **δόση** 28 κ.εκ./δεκάριο (max) ή 50-56 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-55 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέχρι **2 εφαρμογές** με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

ΚΑΛΑΜΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκλίπου): Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*), **Λυριόμυζα** (*Lyriomyza* spp.) με **δόση** 120 κ.εκ./δεκάριο (max) ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-250 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. **Μία (1) εφαρμογή.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση ανά δεκάριο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΜΗ: **Μαρούλι (Θ):** 21 ημέρες. **Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ):** 7 ημέρες. **Φράουλα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκάθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ):** 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΣ ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΨΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διακρίση ανθεκτικότητας: **Ομάδα Τρόπου Δράσης: abamectin: 6.** – Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες θερμοκλίπου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο). – Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΨΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα και συσχεκρυσμένα πριν περάσουν: – 13 ημέρες σε Μαρούλι και παρόμοια σαλατικά, – 3 ημέρες στα υπόλοιπα λαχανικά, – 11 ημέρες σε Καλλιμαστικά θερμοκλίπου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΛΕΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΜΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

ΔΙΑΔΕΙΞΕ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: **P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P260** Μην αναπνέετε εκκινώματα. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε μέσα απορροής προστασίας για τα μάτια. «Φοράτε κατάλληλο ολόσωμο φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτιση και τον ψεκασμό». **SP1** Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Spz8 Πιθανός επικίνδυνος για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδυνά για την εφαρμογή του προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζώων, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν, Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε να ενημερωθούν από την περιοχή για τουλάχιστον 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκλίπου για εξόπλωση βαθύνων/ μελισσών στα θερμοκλίπα.

ΕΙΗ401 "Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: **Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΡΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε οξείαση. **P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φορεί επιρροής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζωτό και ξεπλύνετε. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέως.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 1401

ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, θερμοστάτο και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στις ανάγκες, αφού οι άδεια συσκευασίες καταστραφούν με τριπλή για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπομένουν σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και ασηραγμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώντας το παρασκευασμένο αναμείγμα και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

L/SAFRAN18EC/5LT/CY/1/2