

**ΠΡΟΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ουσιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του αγρού, προέρχοντας να μηνέουν κόκκοι του οικεύματος στο φυλλώμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόδις εφαρμοστοίν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το πρώιμο ή αργά το απόγευμα, σε υψρό έδαφος μετά από βροχή ή πτώσιμα.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόση σκευάσματος γρ./10m <sup>2</sup>	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
<b>ΜΑΡΟΥΛΙ &amp; ΖΑΛΑΤΙΚΑ:</b> (Υγαϊόφρου & Θερικοπήπου) Μαρούλι, Ρόκα, Λαντρατόβεζος, Σκαρόπες/ Πιπεριά, Καρόπες, Ροδική, Σταμανγάδη, Κάρδαμο, Γαϊοκάρδαμο, Κοκκινό σινάπι, Καλέμασα, γεράνιον φύλλωμα (υποτελματιβούνενων ειδών κράμπης)				
<b>ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΦΥΛΛΑ:</b> (Υγαϊόφρου & Θερικοπήπου) Σπανάκι, Ανθράκια, Σέλικουλα/φύλλα τεύτων.				
<b>ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΒΙΡΩΣΙΑ ΑΝΟΗ:</b> (Υγαϊόφρου & Θερικοπήπου) Φράγκοσταφύλα, Σχορταριά, φύλλα στελέχους, Μαΐντονς, Φασοκάρπο, Δενδρόβατός, θυμάρι, Βασιλικό, Διφήνη/Δαντονόφιλα, Δρακοντίο/Εστραγκόν	Kοκκίδες (Σαλιγκάρια), Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες)	38	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά.  4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες.	
<b>ΚΑΛΛΑΠΙΣΤΙΚΑ</b> (Υγαϊόφρου & Θερικοπήπου)				
<b>ΕΞΠΕΡΙΔΟΙΔΗ, ΑΚΡΟΑΡΓΑ, ΜΗΛΟΚΑΠΗ, ΠΥΡΗΝΑΚΙΑ, ΑΜΠΕΙ</b>				
<b>ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ :</b> (Υγαϊόφρου & Θερικοπήπου) Φράγκοσταφύλα, Σέλιερα, Μυρτούλα, Φραγκοτάραφά, Αγριοτραναρύλια, Μουριά, Κουφοβούλια				
<b>ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΙΑ ΛΑΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΩΝ, ΛΑΧΑΝΟ, ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ (Υγαϊόφρου &amp; Θερικοπήπου)</b>				

#### ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., Ιορδάνη Σουκιούργουλον 4,  
2234 Λευκωσία, Τηλ. 22 81 53 53,  
E-mail: contact@premier.com.cy  
www.premier.com.cy



**ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:**  
Βλέπε συσκευασία.

**ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΛΑΙΑΕΙΣ:**  
Doff Portland Limited  
Ηνωμένο Βασίλειο



Green Dot  
Κύπρου

ΜΕ ΠΩΜΑ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ



# FERRONITE SLUG & SNAIL

Κατάλληλο για  
βιολογική γεωργία\*

AP. ΑΔΕΙΑΣ: 4080



Κοκκώδες κοχλιολειμακοτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και λειμάκων (γυμνοσάλιαγκων). Έχει ελκυστική δράση και δρά διά στομάχου. Μετά την κατάποστη του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά.

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**  
Ferric Phosphate 1% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 98,75% β/β  
Ετοιμοχρήστο Κοκκώδες δόλωμα (RB)

Αδιάβροχη σύνθεση  
έως και 14 ημέρες

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



\*Εγκεκριμένο σύμφωνα με το Αρθρό 40 του Κανονισμού ΕΕ 1/107/2009  
\*\*Προϊόν κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ 2018/848 & 2021/1165

800g

Για κάλυψη  
επιφάνειας  
210m<sup>2</sup>

#### Παραπτήσεις:

- Προτιμώτες τις προληπτικές εφαρμογές ή εφαρμόστε μόλις εμφανιστούν οι πρώτες ζημιές.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης των φυτών.
- Επανάληψη εφαρμογής κάθε 2 βροχομέσες, εάν χρειαστεί ή μετά από ισχυρές βροχές ή όταν η ποσότητα σκεύασμάτος στο χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά. Επανάληψη εφαρμογής όταν οι κόκκοι του οικεύματος έχουν καταναλωθεί και οι καρκίνες συνθήκες είναι ευνοϊκές για τα σαλιγκάρια ή γυμνοσάλιαγκες μέχρι το τέλος της καλλιεργείας.
- Το σκεύασμα είναι ανθεκτικό στη βροχή για 14 ημέρες. Συντίνεται επανάληψη της εφαρμογής μετά από 7 ημέρες ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Ολές οι για τη διαθέση γενειές...



38g / 10m<sup>2</sup>

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΥΓΕΙΑΣ ΝΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ:**

- Κατά την εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται σε εποχή με τα έδυμα τηρείν των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Να ιψη χρέεται σε εποχή με τα καλλιεργητικά φύλλα.
- Διασκορπίστε το σκεύασμα ανέμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στα φύλλα.
- Μήν το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο.
- Εφαρμόστε το σταν η επηρεάσεις των φύλλων είναι στεγνή.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΝΤΡΟΥ "Η ΤΟΝ ΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:** Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην θέση παροχής περιοχή παιδιά και κατοκίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την ηφεστία.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΣΘΕΘΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΗΘΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΥ ΤΟΥ:** Δεν έχει φυτοτοξία καν άνω των εφαρμόζεται στις εγκεκριμένες καλλιέργειες στις συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Η εποφή των κοκκώδων ευαίσθητη φύλλα (π.χ. νεαρός, βλαστούς σε εσφρένιες καλλιέργειες, σε θερμοκήπη ή υπό καλύψη) μπορεί να προκαλεσεί εγκαμάτα στη ποικιλία.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Χρησιμοποιείται μόνο του.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΑΝΤΟΣΗΣ:** EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**  
P405+P102 Φυλασσείται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
P270 Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P264 Πλύνετε τη γέρα σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.  
P501 Διαθέτε τον περιεργούμενο/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SPI ΜΗ ΥΠΟΛΑΙΠΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά υγρά. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΣΩΣ:** Μην προκαλέσετε εμέτο και μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζήτηστε αιμάτων ιατρική συμβούλη.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλυνθείτε αιμάτων καλά με άφρονο νερό και ασπρόλινα.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΟΝΗΣ:** Μετακινείστε τον παθώντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση οδικής εισπονής, ζήτηστε ιατρική συμβούλη.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Μην υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπλωτική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

**ΕΥΝΟΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Αποθηκεύστε την αρχική παροβιαστή συσκευασία σε χώρο έτροπο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό ωβό. Σε αυτές τις συνθήκες παραίστε σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι απακευασίες οριστούν κατά παρασκευή από την ημερομηνία για τη διασφάλιση της μη περιεργείας της παρασκευής τους, εναποτέμνεται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.