

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P301+P310+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΜΗΝ προκαλέστε ερετό. **P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. **P333+P313** Εάν παρατηρείτε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **P362+P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξανακρατημούντες. **P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καβαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκυράστε σε σάπια που διευκολύνει την αναπνοή. **P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε οδυνθείσια. **P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολα. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

H226 Υγρό και αιμού εύφλεκτα. **H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάσποτης και διειδόμασης στις αναπνευστικές οδούς. **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H319** Προκαλεί οδοφρόνιο οφθαλμικό ερεθισμό. **H332** Ενιβαθμές σε περίπτωση εισοντού. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H351** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. **H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: 9410-U07J-S00M-E5AN

GOAL PRO 24EC

ZIZANIOKTONO

Αρ. Άδειας Παράλληλου Εμπορίου: 4069-P

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύψυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων, μεταφυτρωτικά.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

500ml



Premier
Shukuroglou

Εγγυημένη σύνθεση:

Oxyfluorfen 24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 75,97 % β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. πορτίδας (Batch No) &
Ημ. Παρούσευν (Man. Date):
032816 & 08/2024



Κάτοχος της Άδειας - Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Παρασκευαστής:
LAINCO S.A.



L/GOALPRO/500ML/CY/2/2

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με μπεκ τύπου σκουόπας και πίεση 2 - 3 Atm.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή το δοχείο, πριν τη χρήση. Γερίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μπχανήματος με καθόρι νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗΝ (**Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κίτρο**): Ψεκασμός κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης. Συνιστάται ο εφαρμογής αρχές της Άνοιξης σε ποικιλίες μανταρινιάς και σε πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και το Φθινόπωρο σε όψιμες ποικιλίες μανταρινιάς και πορτοκαλιάς (Navel).

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (**Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμπολα**), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (**Ροδακινιά, Νεκταρινιά Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κορμοριά, Κερασάτι, Βισσινιά**): Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το Φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λιθαργο (BBCH 00).

ΕΛΑ: Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το Φθινόπωρο - Χειμώνα κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των καρπών (BBCH 80-90) με παρουσία ή μη ελιών στο έδαφος.

ΑΜΠΕΛ (**Ωινοποιία, Επιτραπέζια**): Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το Φθινόπωρο (BBCH 00).

ΣΤΟΧΟΣ: ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΓΡΩΣΤΟΗ ΖΙΖΑΝΙΑ (>85%): Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), (*Diplotaxis erucoides*), Αγριοβρύαντ (*Avena sterilis*). **Μέτρια ευαίσθητη ζιζάνια (70-85%):** Τριβόλι (*Trifolus terrestris*), Οξαλίδα (*Oxalis acetosella*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*).

ΔΟΣΗ: 60 κ.ε.κ./δεκάριο (μέγιστη) με όλο ψεκαστικό υγρό 40 λίτρα/δεκάριο.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:

1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. 2. Η συνολική ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ.δ.ο./δεκ. 3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. 4. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 5. Αποφέύγετε τη χρήση του σε οργανικά έδαφη. 6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω έρημασης, όταν αναμένεται βροχή και όταν φυσάει. 7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ελιά: - 7 μέρες, χωρίς παρουσία ειλιών στο έδαφος ή - 21 μέρες, παρουσία ειλιών στο έδαφος. **Επεριδοειδή** (**Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κίτρο**): 21 μέρες. **Μηλοειδή** (**Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Πυρηνόκαρπα** (**Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά, Κορμοριά, Κερασάτι, Βισσινιά**), Αμπέλι (**Ωινοποιία, Επιτραπέζια**): 180 μέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ οποίες το ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕΙ: Διασείριστο ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Ε Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοτών με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι, καλλιεργητικά μέτρα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΝ οποια ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΕ ΆΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από τη διασπορά σταγονίδων του ψεκαστικού υγρού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

ΣΥΝΗΓΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Στην αρχική απαραβίαση συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος έπαρη, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, μακριά από άμεση έκθεση στο πλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγράφεμη ημερομηνία παρασκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας έχουνένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστροφρικό προγράμμαντα με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, να εναποτελούν σε συμεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάπτυξη ενέργειας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P201** Εφοδιαστεί με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. **P210** Μακριά από θερμότητα/απηνότητα/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. **P260** Μην αναπνέετε εκνεύφωντα. **P270** Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα αποκριάς προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία (μακρυμάνικα μπλούζα, μακρύ παντελόνι και παπούτσια) κατά την ανάμηχη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισβολή στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία (μακρυμάνικα μπλούζα, μακρύ παντελόνι και παπούτσια). **P501:** Λιάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1 Μη ρυπανείτε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. **Sp3** Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφίστετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων, αυμεμπλακμένης μιας φυτικής ζώνης ανάσχεσης 20 μέτρων, από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.

Sp3 Για να προστατεύετε τα αρθρόποδα μη στόχου να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95% ή να αφίστετε μια αμέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Sp3 Για να προστατεύετε τη φυτά μη στόχου να αφίστετε μια αμέκαστη ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή να αφίστετε μια αμέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.