



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4259 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην Ελλάδα,
- τις αιτήσεις με αρ. 4075 και 4619 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- την αίτηση με αρ. 704 (έντυπο 09) για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση του στην αγορά και το διανομέα,
- την αίτηση με αρ. 248 (Έντυπο 10), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. deltamethrin, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1342,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **POLUX**.....ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3706

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

14/02/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Galenika-Fitofarmacija d.o.o

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Polux

2. Μορφή:

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Deltamethrin: 2.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97.15% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

GALENICA FITOFARMACIJA A.D.

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

GALENICA FITOFARMACIJA A.D.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

GALENICA FITOFARMACIJA A.D.

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 κ.εκ. – 500 κ. εκ.	HDPE/PA COEX Κουτί χάρτινο
2	Φιάλη	25 κ.εκ. - 3 λίτρα	HDPE/PA COEX

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Tagros Chemicals India Limited

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Tagros Chemicals India Limited

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

☒

ερασιτέχνες χρήστες

☐

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο και μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. /δεκ.		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CISDI - Γκρέιπ-φρουτ CIDPA - Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE)	30 – 50	100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1 εφαρμογή
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> - CERTCA)	50	100	50		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE)	30	100	(30)		
Μηλοειδή: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα της μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i> - CARPPO) Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL) Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i> - PSYLMA)	30 – 50*	100 – 140	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, <i>Archips rosanus</i> - CACORO)	35		35 – 50		
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i> - PSYLPC)	50		50		
Πυρηνόκαρπα: - Ροδακινιά PRNPS - Βερικοκιά PRNAR - Δαμασκηινιά	Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, (<i>Archips rosanus</i> – CACORO) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i> – ANARLI)	35	100 – 140	35 – 49	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1 εφαρμογή

PRNDO - Κερασιά PRNAV	Ραγολέτιδα (<i>Rhagoletis cerasi</i> - RHAGCE)	40 – 50		40 – 70		
	Μύγα της μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> - CERTCA)	50		50 – 70		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE), <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR) Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i> - LASPFU)	30 – 50		30 – 70		
Αμπέλι** VITVI	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> – POLYBO)	50 (1 ^η γενεά) 50 – 70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	50 – 70	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Κοχυλίδα (<i>Clysia ambigua</i> – CLYSAM)	50 – 70		50 – 70		
	Τζιτζικακία (<i>Empoasca</i> spp. – EMPOSP)	50		50		
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. - APHISP)	50	50 – 100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Δάκος [<i>Bactrocera</i> (<i>Dacus</i>) <i>oleae</i> – DACUOL]	50	100 – 140	50 – 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	1 εφαρμογή
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> – SAISOL)	50		50 – 70	Με την εμφάνιση των προσβολών	
Βαμβακάδα (<i>Euphyllura</i> spp. – EUPHSP)	30 – 50	30 – 70		Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπώβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις		
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> – PRAYOL)	30 (ανθόβ.) 50 (καρπόβ.)		30 – 70		

	φερομονικές παγίδες					
Σολανώδη: - Τομάτα (Υ) LYPES - Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> -HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, <i>(Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA) Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI) Κοφτοσκοκύληκα (<i>Agrotis</i> spp. - AGROSP)	50 30 --	60 – 100	30 – 50 18 – 30 30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> -HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, <i>(Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA) Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	50 30	60 – 100	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερών
	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> -HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, <i>(Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA) Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	50 30	60 – 100	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερών
	Κολοκυνθοειδή: - Αγγούρι (Υ+Θ) - Αγγουράκι (Υ+Θ) CUMSA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> -HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.- SPODSP) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp. – APHISP, <i>Hyperomyzus lactucae</i> -	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών

Κουνουπίδι BRSOB	HYPELA)						
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis segetum</i> – AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> – AGROYP)	---	60 – 100 (Υ)	30 – 50 (Υ)			
	Πιερίδα (<i>Pieris</i> spp. – PIERSP) Μαμέστρα (<i>Mamestra brassicae</i> – BARABR) Πλούζια (<i>Plusia gamma</i> – PYTOGA) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i> – SPODLI) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZYPE, <i>Brevicoryne brassicae</i> – BRVCBR) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGRISP)	---	50	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών	
Μαρούλι (Υ) LACSA	Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i> – PLUTMA)	---	50	50			
	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i> – LAPHEG) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i> – PLUSCH) Αφίδες (<i>Hyperomyzus lactucae</i> - HYPELA, (<i>Aphis</i> spp.- APHISP, <i>Nasonovia ribis-nigri</i> – NASORN)	50	50 – 100	25 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερών	

	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	--		30 – 50		Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
Ψυχανθή (όσπρια) - Φασόλια PHSSS	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis</i> spp. – APHISP) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	--	50 – 100	30 – 50			
	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i> – ACYRON) Σιτόνα (<i>Sitona</i> spp. – SITNSP)	--		25			
Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς) PIBSX	Αφίδα των κουκιών (<i>Aphis fabae</i> – APHIFA) Κάμπια των μπιζελιών (<i>Laspeyresia nigricana</i> – LASPNI) Θρίπας (<i>Thrips angusticeps</i> – THIRIAN) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	--	100	30 – 50		Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Δορυφόρος (<i>Lepinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera littoralis</i> – SPODLI)	--	60	50		Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
Πατάτα SOLTU	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i> – PECTGO) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR)	---	30 – 50	50 – 70		Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 ημερών
	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA) Τζιτζικία (<i>Empoasca</i> spp. – EMPOSP)	---		50			

	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp. – SPODSP) Αφίδα (<i>Aphis gossypii</i> – APHIGO) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	---		30 – 50	
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Myzus persicae</i> – MYZUPE) Μύγα των τεύλων (<i>Pegomya</i> spp. – PEGOSP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> – CHAETI) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp. – SPODSP)	---	50	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών
	Κασσίδα (<i>Cassida nebulosa</i> – CASSNE)	---		50	
Αραβόσιτος*** ZEAMX	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i> – PYRUNU) Σεξάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i> – SESANO) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp. – SPODSP) Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> – RHOPPA, <i>Sitobion avenae</i> – MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	---	60	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών
	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	---		50	
					3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 -21 ημερών (μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 - 14 ημερών για Διαβρώτικα)

Σιτάρι TRZAX	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> – RHOPPA, (<i>Sitobion avenae</i> – MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	---	40 – 60	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1 εφαρμογή
	Αφίδες (<i>Myzus</i> spp. – MYZUSP) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB)	50	50 – 100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημερών
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Φυλλοδέτεες (<i>Archips</i> spp. - ARCHSP, <i>Adoxophyes</i> spp. - ADXPSP, <i>Pandemis</i> spp. – PANDSP)	35		17,5 – 35		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	70	70	50		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλαιοδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/η πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/δεκάριο) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο δεκάριο.
** Δεν επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
*** Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Πορτοκαλιά Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, Νεραντζιά, Αραβόσιτος, Σιτάρι	30 ημέρες
Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Μηλιά Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερασιά, Μπιζέλια	7 ημέρες
Φασόλια (όσπρια)	28 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι	3 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3Α

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--


γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες

10. Συνδυαστικότητα: ---

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια».
«Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή».
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας:
30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά
20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και
10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό.
SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη.
Spe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων

P309+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P301+P310+ P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P330: Ξεπλύντε το στόμα με νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Μετά από επαφή με το δέρμα απλώστε κρέμα βιταμίνης Ε ή απλό γαλάκτωμα. Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευτείτε γιατρό.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ΓΙΑΤΡΟ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτικά μέτρα :

Επιτόπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% Amethocaine Hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά εάν χρειαστεί.

Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως όσο χρειάζεται ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία· για παιδιά 2,5 mg ενδοφλεβίως .

Αντενδείξεις: ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε δροσερό χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία. Διατηρήστε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό..

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο εξοπλισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Όσες ποσότητες του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα, υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για τη νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.
2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 14/02/2025...



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας