

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ● ΜΗΝ προκαλέστε εμετό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

● Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **-10 μέτρων** σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, **-20 μέτρων** σε πρώιμες εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Συνδυαστικότητα: --.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο και όλα τα εξαρτήματά του ψεκαστικού τριετός (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυνματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



5 290770 008138

PROMANAL AGRO

Paraffin oil
(CAS 8042-47-5)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)


Αριθμός Άδειας: 2912

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση
σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Εγγυημένη Σύνθεση: Paraffin oil (CAS 8042-47-5): 83 % β/ο ή 97,6 % β/β,
Βοηθητικές ουσίες: 2,4 % β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI No.:
ATG7-EWPM-XR0Y-S4TJ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. ● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. ● Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ● Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Παρτίδας: 9760324 - Ημερ. Παραγωγής: 03/2024 - Ημερ. Λήξης: 03/2026

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά-Διανομέας:



Premier Shukuroglou

Premier Shukuroglou Cyprus LTD, Τηλ. 22815353, Λευκωσία
www.premier.com.cy, contact@premier.com.cy

Πεδίο εφαρμογής - Εχθρός που ελέγχεται - Δόσεις - Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες): i) **Κόκκινη ψώρα** (*Aonidiella aurantii*), **Παρλατόρια** (*Parlatoria pergandei*) και άλλες ψώρες με 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1000-2240 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 100-220 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. ii) **Αλευρώδεις** (*Dialeurodes citri*, *Aleurotrichus floccosus*) με 1000-1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500-2240 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 50-220 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή μία φθινοπωρινή.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): i) **Ψώρα Σαν-Ζοζέ** (*Quadraspidiotus perniciosus*) και άλλες ψώρες με 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1000 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. ii) **Κόκκινος τετράνυχος** (*Panonychus ulmi*) με 750-1000 κ.εκ. σκευσ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1500 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 125-150 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογή πριν την άνθηση. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά): i) **Ψώρα Σαν-Ζοζέ** (*Quadraspidiotus perniciosus*) και άλλες ψώρες με 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1000 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. ii) **Κόκκινος και Κίτρινος τετράνυχος** (*Panonychus ulmi*) με 750-1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1250 κ.εκ. σκευσ./δεκ. (μέγιστη) σε 125 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκ. Εφαρμογή πριν την άνθηση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κλημεντίνες): **1-2/>>60**, ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά), 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Στα Εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαινετα η μέγιστη δόση/δεκάριο. 3. Κατά τη χρήση του **PROMANAL AGRO** τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 4. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός. 5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 6. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου. 7. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Κάτοχος της άδειας:
W. NEUDORFF GmbH,
GERMANY
L/PROMANAL_Z0LTI_C/1Y1

Ποιότητα εγκεκριμένη και ελεγχόμενη
από τη Neudorff Γερμανίας

Περιέχει 100% εγκεκριμένο παραφινικό λάδι



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο (lt)