

SCOPE FS

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το προϊόν χρησιμοποιείται για επένδυση σπόρων σπόρων, με τη μέθοδο "Slurry". Ανακινείται καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Η συνιστάμενη δόση του σκευάσματος αναμειγνύεται με 0,5 - 1,5 λίτρα νερού/τόνο σπόρων. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των ειδικών μηχανών επένδυσης σπόρων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος, στους σπόρους. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:—

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Ξεπλύνετε το μηχανήμα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΙΤΑΡΙ για **Δαυλίτα** (*Tilletia caries*) με **δόση** 200 κ.εκ./100 κιλά σπόρων. **Μία (1) εφαρμογή** για επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά.

ΚΡΙΘΑΡΙ για **Ραβδωτή κηλίδωση** (*Pyrenophora graminea*) με **δόση** 200 κ.εκ./100 κιλά σπόρων. **Μία (1) εφαρμογή** για επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το σκεύασμα περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία ώστε να ξεχωρίζουν οι επενδυμένοι σπόροι.
2. Γενικά η επένδυση σπόρων γίνεται σε επαγγελματική βάση, από ασφαροπαραγωγούς οίκους ή «επενδυτές» σπόρων που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επένδυση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των επενδυτικών μηχανημάτων και με την ενδεδειγμένη διαδικασία (οδηγίες) πιστοίας επένδυσης. Έτσι διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της επένδυσης του σπόρου. Οι γενικές συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνονται τα εξής:
 - Οι επενδυμένοι σπόροι θα πρέπει να απερόνουν μέσα σε διάστημα ενός μηνός, από την επένδυση και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη σεζόν.
 - Οι επενδυμένοι σπόροι θα πρέπει να απερόνουν κατάλληλα, ώστε να καλύπτονται πλήρως από το έδαφος. Οι σπόροι που τυχόν περισσέψουν, να μην αφήνονται εκτεθειμένοι σε ελεύθερη πρόσβαση στα πτηνά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Σιτάρι, Κριθάρι: Μην εφαρμόζουμε λόγω χρόνου εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΝ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διακριφέν ανθεκτικότητα: **Ορόδα Τρόπου Δράσης: 3**

Στους σάκους που συσκευάζονται επενδυμένοι σπόροι, να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδυμένοι με SCOPE FS (δ.ο. Difenoconazole). Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδυμένοι σπόροι για τροφή ή ζωοτροφή».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΡΡΕΓΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητα των σπόρων στις συνιστάμενες δόσεις και καλλιέργειες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως και σε θερμοκρασία 5 - 30 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΦΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται triplo έκπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίψιμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να ενσωματωθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος όπως άσος βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ύλη, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλα παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκευάσμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

UF1: K66X-WKG2-N40J-X69T

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγούμενες τους φακούς επαφής. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαίρεστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΠΛΗΝΣΗΣ: Μεταφέρετε τον πάθοντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΦΑΝΕΣ:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.

«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».

«Να φοράτε γάντια/προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικό υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.



Κάτοχος της Άδειας:

Sharda Cropchem Espana S.L.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Tηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία

E: contact@premier.com.cy

www.premier.com.cy



Green Dot

Kίπρου



L/SCOPEFS/20LT/CV/1/2