80 mm | 310 mm | 80 mm | 310 mm

550 mm | 65 mm | 420 mm | 65 mm

High Quality Water Soluble Fertilizer

Peters® Professional

The Advanced Exclusive M-77® Improved Recipe Chelating Formula

Plant Starter

10-52-10+TE
(10-22.7-8.3+TE)

EC 0,8

Rooting
Growth
Condensed Growth
Flowering
Foliar Feed
A + B Combination Single Fertilizers

ICL

Peters® Professional

10-52-10 +TE

High Quality Water Soluble Fertilizer

Peters Professional and M-77 are registered trademarks of Everris International B.V.

ICL

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5
6422 PD Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 (0)45-56 09 100

Country of Origin: Belgium

RIGK 1201

4 PE-LD

+40°C 0°C

15 KG NET

8 712994 020156 >

Item number **2104-215HA**

Peters® Professional | **10-52-10+TE** (10-22.7-8.3+TE) | **Plant Starter**

www.icl-sf.info/keokrr

IE

COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK mineral fertiliser with micronutrients, 10-52-10 / 10-22.7-8.3

10 % **TOTAL NITROGEN (N)** 0.3 % Nitric nitrogen; 7.4 % Ammoniacal nitrogen; 2.3 % Ureic nitrogen.
52 % **TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5) (= 22.7 % P);** 52.0 % water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 22.7 % P); 52.0 % phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 22.7 % P) soluble in neutral ammonium citrate.
10 % **POTASSIUM OXIDE (K_2O) (= 8.3 % K)** water soluble.
Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0.020 % Boron (B), as boric acid / 0.015 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.120 % Iron (Fe), chelated by DTPA / 0.060 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.010 % Molybdenum (Mo), as sodium / 0.015 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: Cu 1.5-10; Fe 1.5-7.5; Mn 3-10; Zn 2-10.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

Instructions for intended use, including application rates: General dosage rate recommendation for Container Nursery Stock and potted plants. 0.5-2.0 g/L in irrigation water to the plants. Dosage rate depending on interval or continuous feeding program and plant requirements. Limit the number of applications to prevent high Phosphate content in the growing medium. Contact ICL / Everris or our local distributor for specific recommendations. www.icl-sf.com. Apply lower rates in greenhouses or under hot climate conditions. *To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.*

EUH210: Safety data sheet available on request.

Granulometry: Combination of powder and granules. 55 % of the product passes through sieve of 1 mm and the remaining 45 % through sieve of 4 mm.

Ingredients: Monoammonium phosphate [7722-76-1][1]; Mono potassium phosphate [7778-77-0][1]; Urea [57-13-6][1].
[1]:Virgin material substances and mixtures.

NL

SAMENGESTELDE VASTE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMESTSTOF
NPK minerale meststof met micronutriënten, 10-52-10

10 % **TOTAAL STIKSTOF (N)** 0,3 % Nitraatstikstof; 7,4 % Ammoniumstikstof; 2,3 % Ureumstikstof.
52 % **TOTAAL FOSFORPENTOXIDE (P_2O_5)** 52,0 % in water oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5); 52,0 % neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P_2O_5).
10 % **KALIUMOXIDE (K_2O)** In water oplosbaar.
Chloorarm.

Micronutriënten volledig oplosbaar in water: 0,020 % Boor (B), als boorzuur / 0,015 % Koper (Cu), gecheleerd door EDTA / 0,120 % IJzer (Fe), gecheleerd door DTPA / 0,060 % Mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA / 0,010 % Molybdeen (Mo), als natrium / 0,015 % Zink (Zn), gecheleerd door EDTA.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Algemene doseringsaanbeveling voor containerteelt en potplanten. 0,5-2,0 g/L in water waarmee planten bevloeid worden. Dosering afhankelijk van intermitterend of continu voedingsprogramma en plantvereisten. Beperk het aantal toepassingen om een hoog fosfaatgehalte in het teeltmedium te voorkomen. Neem contact op met ICL/Everris of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-sf.com. Lagere dosissen toepassen in kassen of bij warme weersomstandigheden. *De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.*

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Korrelgrootteverdeling: combinatie van poedervorm en korrels. 55 % van het product gaat door een zeef met een maaswijdte van 1 mm en de resterende 45 % door een zeef met een maaswijdte van 4 mm.

Bestanddelen: Mono ammoniumfosfaat [7722-76-1][1]; Mono kaliumfosfaat [7778-77-0][1]; Ureum [57-13-6][1].
[1]:Stoffen en mengsels als primair materiaal.

IT

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK con microelementi, 10-52-10

10 % **AZOTO (N) TOTALE** 0,3 % Azoto nitrico; 7,4 % Azoto ammoniacale; 2,3 % Azoto ureico.
52 % **ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE** 52,0 % anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 52,0 % anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro.
10 % **OSSIDO DI POTASSIO (K_2O)** Idrosolubile.
A basso tenore di cloruro.

Microelementi completamente solubili in acqua: 0,020 % Boro (B), nella forma di acido borico / 0,015 % Rame (Cu), chelato con EDTA / 0,120 % Ferro (Fe), chelato con DTPA / 0,060 % Manganese (Mn), chelato con EDTA / 0,010 % Molibdeno (Mo), nella forma di sodio / 0,015 % Zinco (Zn), chelato con EDTA.

Intervallo di pH per garantire la stabilità dei chelati presenti: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Istruzioni per l'uso previsto, compresi le dosi: Raccomandazione generale sul dosaggio per postime di vivaio in contenitori e piante in vaso. 0,5-2,0 g/L nell'acqua di irrigazione per le piante. Dosaggio a seconda dell'intervallo o del programma di alimentazione continua e delle esigenze della pianta. Limitare il numero di applicazioni per evitare un elevato contenuto di fosfati nel terreno di coltura. Per raccomandazioni specifiche contatta ICL / Everris o il tuo distributore locale www.icl-sf.com. Applicare quantità inferiori nelle serre o in climi caldi. *Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.*

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Granulometria: combinazione di polvere e granuli. Il 55 % del prodotto passa attraverso il setaccio di 1 mm e l'45 % rimanente attraverso il setaccio di 4 mm.

Ingredienti: Fosfato di monoammonio [7722-76-1][1]; Fosfato monopotassico [7778-77-0][1]; Urea [57-13-6][1].
[1]:Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

ES

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK con micronutrientes, 10-52-10

10 % **NITRÓGENO (N) TOTAL** 0,3 % Nitrógeno nítrico; 7,4 % Nitrógeno amoniacal; 2,3 % Nitrógeno ureico.
52 % **PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL** 52,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua total; 52,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro.
10 % **ÓXIDO DE POTASIO (K_2O)** Hidrosoluble.
Pobre en cloro.

Micronutrientes completamente solubles en agua: 0,020 % Boro (B), como ácido bórico / 0,015 % Cobre (Cu), quelado por EDTA / 0,120 % Hierro (Fe), quelado por DTPA / 0,060 % Manganeso (Mn), quelado por EDTA / 0,010 % Molibdeno (Mo), como sodio / 0,015 % Zinc (Zn), quelado por EDTA.

Intervalo de pH para el que se garantiza la estabilidad de los quelatos presentes es: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones de uso, incluida la dosis de aplicación: Recomendación general de dosificación para plantas de vivero y en maceta. 0,5-2,0 g/L en el agua de riego de las plantas. La dosificación depende del programa nutricional a intervalos o continuo y de las necesidades de las plantas. Limitar el número de aplicaciones para evitar un alto contenido de fosfato en el medio de cultivo. Póngase en contacto con ICL/Everris o con nuestro distribuidor en su zona para recibir recomendaciones específicas. www.icl-sf.com. Aplicar dosis más bajas en invernaderos o en condiciones de clima cálido. *Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.*

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Granulometría: Combinación de polvo y granulado. El 55 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm y el 45 % restante por un tamiz de 4 mm.

Ingredientes: Fosfato monoamónico [7722-76-1][1]; Dihidrogenofosfato de potasio [7778-77-0][1]; Urea [57-13-6][1].
[1]:Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

PT

ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES
Adubo mineral com micronutrientes NPK, 10-52-10

10 % **AZOTO (N) TOTAL** 0,3 % Azoto nítrico; 7,4 % Azoto amoniacal; 2,3 % Azoto ureico.
52 % **PENTÓXIDO DE FÓSFORO TOTAL (P_2O_5)** 52,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 52,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em citrato de amónio neutro.
10 % **ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O)** Solúvel em água.
Pobre em cloro.

Micronutrientes completamente solúveis em água: 0,020 % Boro (B), sob a forma de ácido bórico / 0,015 % Cobre (Cu), quelatado por EDTA / 0,120 % Ferro (Fe), quelatado por DTPA / 0,060 % Manganês (Mn), quelatado por EDTA / 0,010 % Molibdénio (Mo), sob a forma de sódio / 0,015 % Zinco (Zn), quelatado por EDTA.

Intervalo de pH para garantir a estabilidade dos quelatos presentes: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.

Instruções para a utilização prevista, incluindo a dose de aplicação: Recomendação da taxa geral de dosagem para viveiros de produção de plantas em contentores e para plantas em vasos. 0,5-2,0 g/L na água de irrigação para as plantas. Taxa de dosagem dependente de o programa de alimentação ser contínuo ou com intervalos e das exigências das plantas. Limitar o número de aplicações para evitar alto teor de fosfato no meio de cultivo. Contacte a ICL/Everris ou o nosso distribuidor local para recomendações específicas. www.icl-sf.com. Aplicar taxas inferiores em estufas ou em condições de clima quente. *Utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não exceder as doses de aplicação recomendadas.*

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

Granulometria: Combinação de pó e de grânulo. 55 % do produto passa num peneiro com malha de 1 mm e os restantes 45 % através de um peneiro com malha de 4 mm.

Ingredientes: Fosfato de monoamônio [7722-76-1][1]; Fosfato monopotássico [7778-77-0][1]; Uréia [57-13-6][1].
[1]:Substâncias e misturas à base de matérias virgens.

AU / NZ

FERTILISER - NPK Fertiliser, with micro-nutrients, 10-23-8

10 % **TOTAL NITROGEN (N)** 0.3 % As nitrate nitrogen; 7.4 % As ammoniacal nitrogen; 2.3 % As urea nitrogen.
22.7 % **TOTAL PHOSPHORUS (P)** 22.7 % P water soluble. 22.7 % P citrate soluble.
8.3 % **POTASSIUM (K)** water soluble. 1.0 % As nitrate; 7.3 As phosphate.
Low in chloride.

Micro-nutrients are completely water soluble: 0.020 % Boron (B), as boric acid / 0.015 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.120 % Iron (Fe), chelated by DTPA / 0.060 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.010 % Molybdenum (Mo), as sodium / 0.015 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

Impurities: Biuret (maximum): 6.0 g/kg N; Cd (maximum): 3.7 mg/kg, 16.2 mg/kg P. Hg (maximum): 0.9 mg/kg.

WARNING: Do not swallow. The dust from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of cadmium and mercury in the soil. Depending on soil characteristics, irrigation water quality, plant species and variety, crop uptake of cadmium may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australia New Zealand Food Standards Code. In pasture, the offal from grazing animals may also exceed these limits. This fertilizer is for soil application only. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

INFO

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
Repacking not allowed without written approval from ICL / Everris International B.V.
CAUTION: Keep out of reach of children and pets.

This product is subject to Regulation (EU)2019/1148: all suspicious transactions, disappearances and thefts should be reported to the revelant competent authority / national contact point (bit.ly/overview_national_contact_points_EPR)

Emergency Telephone Number: **+44 1235 239 670** *(24/7)*

Non-Emergency Telephone Number: **+31 (0)418 655 700**

AU-Emergency Telephone Number: **02 8014 4558** *(24/7)*
NZ-Emergency Telephone Number: **09 929 1483** *(24/7)*

Distributed by:
AU/NZ: **Everris Australia Pty Ltd.,** 211/33 Lexington Drive, Bella Vista, NSW 2153. Tel: +61 2 8801-3300.

CE

FR

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 10-52-10

10 % **AZOTE (N) TOTAL;** 0,3 % d' Azote nitrique; 7,4 % d' Azote ammoniacal; 2,3 % d' Azote uréique.
52 % **ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL** 52,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau; 52,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre.
10 % **OXYDE DE POTASSIUM (K_2O)** Soluble dans l'eau.
Faible teneur en chlore.

Oligo-éléments complètement solubles dans l'eau: 0,020 % Bore (B), sous forme d'acide borique / 0,015 % Cuivre (Cu), chélaté par EDTA / 0,120 % Fer (Fe), chélaté par DTPA / 0,060 % Manganèse (Mn), chélaté par EDTA / 0,010 % Molybdène (Mo), sous forme de sodium / 0,015 % Zinc (Zn), chélaté par EDTA.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructions relatives à l'utilisation prévue, y compris les doses: Recommandation générale concernant le taux de dosage pour le matériel de pépinière en pots et les plantes en pot. 0,5-2,0 g/L dans l'eau d'irrigation des plantes. Le taux de dosage dépend du programme d'alimentation en continu ou discontinu et des besoins des plantes. Limiter le nombre d'applications pour éviter une teneur élevée en phosphate dans le milieu de culture. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter ICL / Everris www.icl-sf.com ou votre distributeur local. Appliquer des doses plus faibles dans les serres ou dans des conditions climatiques à températures élevées. *À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.*

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Granulométrie: combinaison de poudre et de granulés. 55 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm et les 45 % restants à travers un tamis à mailles de 4 mm.

Ingrédients: Phosphate monoammonique [7722-76-1][1]; Phosphate monopotassique [7778-77-0][1]; Urée [57-13-6][1].
[1]:Substances et mélanges à base de matières vierges.

DE

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK, 10-52-10

10 % **GESAMTSTICKSTOFF (N)** 0,3 % Nitratstickstoff; 7,4 % Ammoniumstickstoff; 2,3 % Carbamidstickstoff.
52 % **GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5)** 52,0 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5); 52,0 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5).
10 % **KALIUMOXID (K_2O)** wasserlöslich.
Chloridarm.

Spurennährstoffe sind vollständig wasserlöslich: 0,020 % Bor (B), als Borsäure / 0,015 % Kupfer (Cu), als Chelat von EDTA / 0,120 % Eisen (Fe), als Chelat von DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), als Chelat von EDTA / 0,010 % Molybdän (Mo), als Natrium / 0,015 % Zink (Zn), als Chelat von EDTA.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: Allgemeine Dosierungsratenempfehlung für Baumschulenkübel und Topfpflanzen 0,5-2,0 g/L in Gießwasser an die Pflanzen. Dosierungsrate abhängig davon, ob Intervall-Zuführungsprogramm oder kontinuierliches Zuführungsprogramm und Pflanzenanforderungen. Die Anzahl der Anwendungen begrenzen, um hohen Phosphatgehalt in dem Kultursubstrat zu verhindern. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit ICL / Everris oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-sf.com. In Gewächshäusern oder unter heißen Klimabedingungen geringere Raten anwenden. *Nur bei anerkanntem Bedarf anwen den. Aufwandmenge nicht überschreiten.*

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Düngemittel ohne Ammoniumnitrat, keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Korngröße: Kombination von Pulver und Granulate. Das Produkt passiert zu 55 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm, die verbleibenden 45 % passieren ein Sieb mit einer Maschenweite von 4 mm.

Inhaltsstoffe: Monoammoniumphosphat [7722-76-1][1]; Kaliumdihydrogenphosphat [7778-77-0][1]; Harnstoff [57-13-6][1].
[1]:Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen.

PL

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 10-52-10

10 % **AZOT CAŁKOWITY (N)** 0,3 % Azot azotanowy; 7,4 % Azot amonowy; 2,3 % Azot amidowy.
52 % **CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5)** 52,0 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5). 52,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu.
10 % **TLENEK POTASU (K_2O)** Rozpuszczalny w wodzie.
Niska zawartość chlorków.

Z mieszaniną mikroskładniki pokarmowe całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,020 % Bor (B), w postaci kwasu borowego / 0,015 % Miedź (Cu), schelatowany przez EDTA / 0,120 % Żelazo (Fe), schelatowany przez DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), w postaci sodu / 0,015 % Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: Ogólne zalecenie dotyczące dawkowania dla materiału szkółkarskiego w pojemnikach i roślin doniczkowych. 0,5-2,0 g/L w wodzie nawadniającej dla roślin. Dawkowanie zależy od programu interwałowego lub ciągłego programu odżywiania oraz wymagań roślin. Ograniczyć liczbę zastosowań, aby zapobiec wysokiej zawartości fosforanów w podłożu uprawowym. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z ICL / Everris lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-sf.com. Niższe dawki stosować w szklarniach lub w warunkach klimatu gorącego. *Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.*

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Granulometria: Mieszanka proszku i granule. 55 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm, a pozostałe 45 % przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 4 mm.

Składniki: Fosforan monoamonowy [7722-76-1][1]; Monofosforan potasu [7778-77-0][1]; Mocznik [57-13-6][1].
[1]:Pierwotne surowce i mieszaniny.

GR

ΣΎΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΌ ΑΝΌΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ
Ανόργανο λίπασμα NPK με μικροθρεπτικά στοιχεία, 10-52-10

10 % **ΟΛΙΚΌ ΆΖΩΤΟ (N)** 0,3 % Νιτρικό άζωτο; 7,4 % Αμμωνιακό άζωτο; 2,3 % Ουρικό άζωτο.
52 % **ΟΛΙΚΌ ΠΕΝΤΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΌΡΟΥ (P_2O_5)** 52,0 % υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5); 52,0 % πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο.
10 % **ΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΊΟΥ (K_2O)** Υδατοδιαλυτό.
Χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο.

Πλήρως υδατοδιαλυτά θρεπτικά ιχνοστοιχεία: 0,020 % Βόριο (B), ως βορικό οξύ / 0,015 % Χαλκός (Cu), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA / 0,120 % Σίδηρος (Fe), ως χηλικό σύμπλοκο με DTPA / 0,060 % Μαγγάνιο (Mn), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA / 0,010 % Μολυβδαίνιο (Mo), ως νάτριο / 0,015 % Ψευδάργυρος (Zn), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA.

Περιοχή pH, προκειμένου να είναι εγγυημένη η σταθερότητα των παρόντων χηλικών: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Οδηγίες για την προβλεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων της δοσολογίας; Γενική σύσταση δοσολογίας για δοχεία φυτωρίου και φυτά σε γλάστρες. 0,5-2,0 g/L στο αρδευτικό ύδωρ για τα φυτά. Η δοσολογία εξαρτάται από το διάστημα ή το πρόγραμμα συνεχούς τροφοδοσίας και τις απαιτήσεις του φυτού. Περιορίστε τον αριθμό εφαρμογών για την πρόληψη υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο στο υπόστρωμα καλλιέργειας. Επικοινωνήστε με την ICL / Everris ή με τον τοπικό μας διανομέα για ειδικές συστάσεις. www.icl-sf.com. Εφαρμόζετε χαμηλότερη δοσολογία σε θερμοκήπια ή υπό θερμές κλιματικές συνθήκες. *Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.*

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κοκκομετρική τιμή: Συνδυασμός σκόνης και κόκκοι. Το 55 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm και το υπόλοιπο 45 % από κόσκινο 4 mm.

Συστατικά: Φωσφορικό μονοαμμώνιο [7722-76-1][1]; Δισόξινο φωσφορικό κάλιο [7778-77-0][1]; Ουρία [57-13-6][1].
[1]:Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών.

RO

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 10-52-10

10 % **AZOT (N) TOTAL** 0,3 % Azot nitric; 7,4 % Azot amoniacal; 2,3 % Azot ureic.
52 % **PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL** 52,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă. 52,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru (P_2O_5).
10 % **OXID DE POTASIU (K_2O)** Solubil în apă.
Cu conținut scăzut de clor.

Oligoelemente sunt complet solubile în apă: 0,020 % Bor (B), ca acid boric / 0,015 % Cupru (Cu), chelat cu EDTA / 0,120 % Fier (Fe), chelat cu DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), chelat cu EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), ca sodiu / 0,015 % Zinc (Zn), chelat cu EDTA.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv dozele de aplicare: Recomandare generală privind dozarea pentru plante de pepinieră și plante în ghivece. 0,5-2,0 g/L, în apa utilizată pentru irigarea plantelor. Cantitatea dozată depinde de programul de hrănire a plantelor (continuu sau la anumite intervale) și de cerințele plantelor. Limitați numărul de aplicări, astfel încât să nu permiteți acumularea unor cantități ridicate de fosfat în mediul de creștere. Pentru recomandări specifice, contactați ICL/Everris sau distribuitorul nostru local. www.icl-sf.com. Aplicați cantități mai mici la plantele din sere sau în condiții climatice cu temperaturi ridicate. *A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.*

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Granulometrie: Combinație de pulbere și granule. 55 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm, iar restul de 45 % trece printr-o sită cu ochiuri de 4 mm.

Ingrediente: Fosfatul monoamoniu [7722-76-1][1]; Fosfatul monopotasic [7778-77-0][1]; Uree [57-13-6][1].
[1]:Substanțe și amestecuri din materiale virgine.

HR

SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA
NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 10-52-10

10 % **UKUPNI DUŠIK (N)** 0,3 % Nitratni dušik; 7,4 % Amonijski dušik; 2,3 % Amidni dušik
52 % **UKUPNI FOSFOROV PENTOKSID (P_2O_5)** 52,0 % fosforov pentoksid (P_2O_5) topljiv u vodi; 52,0 % fosforov pentoksid (P_2O_5) topljiv u neutralnom amonijevu citratu.
10 % **KALIJEV OKSID (K_2O)** Topiv u vodi.
Siromašno kloridom.

Mikro-hranjivihu su potpuno topivi u vodi: 0,020 % Bor (B), kao borna kiselina / 0,015 % Bakar (Cu), kelirano EDTA / 0,120 % Željezo (Fe), kelirano DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), kelirano EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), kao natrij / 0,015 % Cink (Zn), kelirano EDTA.

pH raspon kojim se jamči stabilnost prisutnih keliranih tvari: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđene količine: Opća preporuka za količinu doziranja za biljke koje se uzgajaju u rasadniku u spremniku i za biljke u lončanicama. 0,5-2,0 g/L u vodi za navodnjavanje biljaka. Količina doziranja ovisno o intervalu ili programu kontinuirane hranidbe i zahtjevima biljke. Ograničiti broj primjena kako bi se spriječio visoki sadržaj fosfata u mediju za rast. Za određene preporuke obratite se tvrtki ICL/Everris ili našem lokalnom distributeru. www.icl-sf.com. Primjenjivati niže količine u staklenicima ili u uvjetima vruće klime. *Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.*

EUH210: Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Granulometrija: kombinacija praha i granule. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 55 % proizvoda, a ostalih 45 % kroz sito veličine otvora od 4 mm.

Sastojci: Monoamonijev fosfat [7722-76-1][1]; Monokalijev fosfat [7778-77-0][1]; Urea [57-13-6][1].
[1]:Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina.

2104-215HA
PMG2104HAH (R109103122A)

PMG2104HAH_550x80x310.ai