80 mm 310 mm 80 mm 310 mm

65 mm

420 mm

550 mm

65 mm

Peters® Professional

High Quality Water Soluble Fertilizer

Peters® Professional

Allrounder

20-20-20+TE

(20-8.7-16.6+TE)

EC 0,8

Rooting

Growth

Condensed Growth

Flowering

Foliar Feed

A + B

Combination Single Fertilizers

Peters® Professional

20-20-20 +TE

High Quality Water Soluble Fertilizer

Peters Professional and M-77 are registered trademarks of Everris International B.V.

ICL

ICL

Item number 2113-215HA

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidstraat 5
6422 PD Heerlen
The Netherlands
Tel: +31 (0)45-56 09 100

Country of Origin: Belgium

RIGK 1201

PE-LD

15 KG NET

8 712994 016845 >

Peters® Professional

20-20-20+TE

(20-8.7-16.6+TE)

Allrounder

www.ic-ef.info/verkoop

IE

COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK mineral fertiliser with micronutrients, 20-20-20 / 20-8.7-16,6

20 % TOTAL NITROGEN (N) 4,5 % Nitric nitrogen;
2,4 % Ammoniacal nitrogen; 13,1 % Urea nitrogen.
20 % TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5) (=8.7 % P)
20,0 % water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 8,7 % P);
20,0 % phosphorus pentoxide (P_2O_5) (= 8.7 % P) soluble in neutral ammonium citrate.
20 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) (= 16,6 % K) water soluble.
Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0,020 % Boron (B), as boric acid / 0,015 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0,120 % Iron (Fe), chelated by DTPA / 0,060 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0,010 % Molybdenum (Mo), as sodium / 0,015 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

Instructions for intended use, including application rates: General dosage rate recommendation for Container Nursery Stock and potted plants, 0,5-2,0 g/L in irrigation water to the plants. Dosage rate depending on interval or continuous feeding program and plant requirements. Contact ICL / Everris or our local distributor for specific recommendations. www.icl-ef.com. *Apply lower rates in greenhouses or under hot climate conditions. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.*

EUH210: Safety data sheet available on request.

Granulometry: Combination of powder and prills. 85 % of the product passes through sieve of 1 mm and the remaining 15 % through sieve of 5 mm.

Ingredients: Potassium nitrate [7757-79-1]; Urea [57-13-6]; Monoammonium phosphate [7722-76-1]; Mono potassium phosphate [7778-77-0]. *1: Virgin material substances and mixtures*

ES

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK con micronutrientes, 20-20-20

20 % NITRÓGENO (N) TOTAL 4,5 % Nitrógeno nítrico;
2,4 % Nitrógeno amoniacal; 13,1 % Nitrógeno ureico.
20 % PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL 20,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 20,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en citrato amónico neutro
20 % ÓXIDO DE POTASIO (K_2O) Hidrosoluble.
Pobre en cloro.

Micronutrientes completamente solubles en agua:
0,020 % Boro (B), como ácido bórico / 0,015 % Cobre (Cu), quelado por EDTA / 0,120 % Hierro (Fe), quelado por DTPA / 0,060 % Manganeso (Mn), quelado por EDTA / 0,010 % Molibdeno (Mo), como sodio / 0,015 % Zinc (Zn), quelado por EDTA.

Intervalo de pH para el que se garantiza la estabilidad de los quelatos presentes es: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones de uso, incluida la dosis de aplicación: Recomendación general de dosificación para plantas de vivero y en maceta, 0,5-2,0 g/L en el agua de riego de las plantas. La dosificación depende del programa nutricional a intervalos o continuo y de las necesidades de las plantas. Póngase en contacto con ICL/Everris o con nuestro distribuidor en su zona para recibir recomendaciones específicas. www.icl-ef.com. *Aplicar dosis más bajas en invernadero o en condiciones de clima cálido.Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.*

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Granulometría: Combinación de polvo y perlas. El 85 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm y el 15 % restante por un tamiz de 5 mm.

Ingredientes: Nitrato de potasio [7757-79-1]; Urea [57-13-6]; Fosfato monoamónico [7722-76-1]; Dihidrogenofosfato de potasio [7778-77-0]. *1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes*

IT

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK con microelementi, 20-20-20

20 % AZOTO (N) TOTALE 4,5 % Azoto nitrico;
2,4 % Azoto ammoniacale; 13,1 % Azoto ureico.
20 % ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE 20,0 % anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 20,0 % anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro
20 % OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) idrosolubile.
A basso tenore di cloruro.

Microelementi completamente solubili in acqua: 0,020 % Boro (B), nella forma di acido borico / 0,015 % Rame (Cu), chelato con EDTA / 0,120 % Ferro (Fe), chelato con DTPA / 0,060 % Manganese (Mn), chelato con EDTA / 0,010 % Molibdeno (Mo), nella forma di sodio / 0,015 % Zinco (Zn), chelato con EDTA.

Intervallo di pH per garantire la stabilità dei chelati presenti:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10..

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

Istruzioni per l'uso previsto, compresi le dosi: Raccomandazione generale sul dosaggio per postime di vivaio in contenitori e piante in vaso, 0,5-2,0 g/L nell'acqua di irrigazione per le piante. Dosaggio a seconda dell'intervallo o del programma di alimentazione continua e delle esigenze della pianta. Per raccomandazioni specifiche contatta ICL / Everris o il tuo distributore locale www.icl-ef.com. Applicare quantità inferiori nelle serre o in climi caldi. *Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.*

EUH210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Granulometria: combinazione di polvere e prill. Il 85 % del prodotto passa attraverso il setaccio di 1 mm e l'15 % rimanente attraverso il setaccio di 5 mm.

Ingredienti: Nitrato di potassio [7757-79-1]; Urea [57-13-6]; Fosfato di monoammonio [7722-76-1]; Fosfato monopotassico [7778-77-0]. *1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo*

GR

Σ'ΥΜΟΒΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Ανόργανο λίπασμα NPK (Ca, Mg, S) με μικροθρεπτικά στοιχεία, 20-20-20

20 % ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 4,5 % Νιτρικό άζωτο;
2,4 % Αμμωνιακό άζωτο; 13,1 % Ουρικό άζωτο.
20 % ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΟΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5)
20,0 % υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5);
20,0 % πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5) διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο
20 % ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O) Υδατοδιαλυτό.
Χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο.

Πλήρως υδατοδιαλυτά θρεπτικά στοιχεία: 0,020 % Βόριο (B), ως βορικό οξύ / 0,015 % Χαλκός (Cu), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA / 0,120 % Σίδηρος (Fe), ως χηλικό σύμπλοκο με DTPA / 0,060 % Μαγγάνιο (Mn), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA / 0,010 % Μολυβδένιο (Mo), ως νάτριο / 0,015 % Ψευδάργυρος (Zn), ως χηλικό σύμπλοκο με EDTA.

Περιοχή pH, προκειμένου να είναι εγγυημένη η σταθερότητα των παρόντων χηλικών: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Οδηγίες για την προβλεπόμενη χρήση, συμπεριλαμβανομένων της δοσολογίας: Γενική σύσταση δοσολογίας για δοχεία φυτωρίου και φυτά σε γλάστρες, 0,5-2,0 g/L στο αρδευτικό ύδωρ για τα φυτά. Η δοσολογία εξαρτάται από το διάστημα ή τη πρόγραμμα συνεχούς τροφοδοσίας και τις απαιτήσεις του φυτού. Επικοινωνήστε με την ICL / Everris ή με τον τοπικό μας διανομέα για ειδικές συστάσεις. www.icl-ef.com. Εφαρμόζετε χαμηλότερη δοσολογία σε θερμοκοιτίες ή υπό θερμές κλιματικές συνθήκες. *Χρησιμοποιείστε μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Μη μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.*

EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κοκκομετρική τιμή: Συνδυασμός σκόνης και σβώλων. Το 85 % του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm και το υπόλοιπο 15 % από κόσκινο 5 mm.

Συστατικά: Νιτρικό κάλιο [7757-79-1]; Ουρία [57-13-6]; Φωσφορικό μονοαμμώνιο [7722-76-1]; Δισόξινο φωσφορικό κάλιο [7778-77-0]. *1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών*

PL

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK nawóz mineralny, 20-20-20

20 % AZOT CAŁKOWITY (N) 4,5 % Azot azotanowy;
2,4 % Azot amidowy; 13,1 % Azot amidowy.
20 % CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5)
20,0 % rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5);
20,0 %pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrianie amonu;
20 % TLENEK POTASU (K_2O) Rozpuszczalny w wodzie.
Niska zawartość chlorków.

Z nieszaniną mikroskładników pokarmowe całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,020 % Bor (B), w postaci kwasu borowego / 0,015 % Miedź (Cu), schelatowany przez EDTA / 0,120 % Żelazo (Fe), schelatowany przez DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), w postaci sodu / 0,015 % Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: Ogólne zalecenie dotyczące dawkowania dla materiału szkółkarskiego w pojemnikach i roślin doniczkowych, 0,5-2,0 g/L w wodzie nawadniającej dla roślin. Dawkowanie zależy od programu interwałowego lub ciągłego programu odżywiania oraz wymagań roślin. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z ICL / Everris lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-ef.com. Niższe dawki stosować w szklarniach/lub w warunkach klimatu gorącego. *Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zaproponowanego stosowania.*

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Granulometria: Mieszanka proszku i brylek. 85 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm, a pozostałe 15 % przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 5 mm.

Składniki: Azotan potasu [7757-79-1]; Mocznik [57-13-6]; Fosforan monoamonowy [7722-76-1]; Monofosforan potasu [7778-77-0]. *1: Pierwotne surowce i mieszaniny*

RO

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 20-20-20

20 % AZOT (N) TOTAL 4,5 % Azot nitric;
2,4 % Azot amoniacal; 13,1 % Azot ureic.
20 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL 20,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 20,0 % pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru .
20 % OXID DE POTASIU (K_2O) Solubil în apă.
Cu conținut scăzut de clor.

Oligoelemente sunt complet solubile în apă: 0,020 % Bor (B), ca acid boric / 0,015 % Cupru (Cu), chelat cu EDTA / 0,120 % Fier (Fe), chelat cu DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), chelat cu EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), ca sodiu / 0,015 % Zinc (Zn), chelat cu EDTA.

Interval de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Îngrășământul conține uree, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv dozele de aplicare: Recomandare generală privind dozarea pentru plante de pepinieră și plante în ghivece, 0,5-2,0 g/L în apa utilizată pentru irigarea plantelor. Cantitatea dozată depinde de programul de hrănire a plantelor (continuu sau la anumite intervale) și de cerințele plantelor. Pentru recomandări specifice, contactați ICL/Everris sau distribuitorul nostru local. www.icl-ef.com. Aplicați cantități mai mici la plantele din sere sau în condiții climatice cu temperaturi ridicate. *A se utilizca exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.*

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Granulometrie: Combinație de pulbere și perle. 85 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm, iar restul de 15 % trece printr-o sită cu ochiuri de 5 mm.

Ingrediente: Azotat de potasiu [7757-79-1]; Uree [57-13-6]; Fosfatul monoamoniu [7722-76-1]; Fosfatul monopotasic [7778-77-0]. *1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine*

GB

FERTILISER - NPK Fertiliser with trace elements, blend, 20-20-20 / 20-8,7-16,6

20 % TOTAL NITROGEN (N) 4,5 % Nitric nitrogen;
2,4 % Ammoniacal nitrogen; 13,1 % Urea nitrogen.
20 % PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5) (= 8,7 % P)
Soluble in neutral ammonium citrate and in water.
20,0 % P_2O_5 (= 8,7 % P) water soluble;
20 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) (= 16,6 % K) Water soluble.
Low in chloride.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY,
Repacking not allowed without written approval from ICL / Everris International B.V.
CAUTION: Keep out of reach of children and pets.

This product is subject to Regulation (EU)2019/1148: all suspicious transactions, disappearances and thefts should be reported to the relevant competent authority / national contact point (bit.ly/overview_national_contact_points_EPR)

Emergency Telephone Number: **+44 1235 239 670** *(24/7)*

Trace elements are completely water soluble: 0,020 % Boron (B) / 0,015 % Copper (Cu) chelated by EDTA / 0,120 % Iron (Fe) chelated by DTPA / 0,060 % Manganese (Mn) chelated by EDTA / 0,010 % Molybdenum (Mo) / 0,015% Zinc (Zn) chelated by EDTA.

EUH210: Safety data sheet available on request.

INFO

Non-Emergency Telephone Number:
+31 (0)418 655 700

AU-Emergency Telephone Number: **02 8014 4558** *(24/7)*
NZ-Emergency Telephone Number: **09 929 1483** *(24/7)*

Distributed by:
AU/NZ: **Everris Australia Pty Ltd.,**
21/33 Lexington Drive, Bella Vista, NSW 2153.
Tel: +61 2 8801-3300.

CE

FR

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 20-20-20

20 % AZOTE (N) TOTAL 4,5 % d' Azote nitrique;
2,4 % d' Azote ammoniacal; 13,1 % d' Azote uréique.
20 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL 20,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau; 20,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre.
20 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) Soluble dans l'eau.
Faible teneur en chlore.

Oligo-éléments complétement solubles dans l'eau: 0,020 % Bore (B), sous forme d'acide borique / 0,015 % Cuivre (Cu), chélaté par EDTA / 0,120 % Fer (Fe), chélaté par DTPA / 0,060 % Manganèse (Mn), chélaté par EDTA / 0,010 % Molybdène (Mo), sous forme de sodium / 0,015 % Zinc (Zn), chélaté par EDTA.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

Instructions relatives à l'utilisation prévue, y compris les doses: Recommandation générale concernant le taux de dosage pour le matériel de pépinière en pots et les plantes en pot, 0,5-2,0 g/L dans l'eau d'irrigation des plantes. Le taux de dosage dépend du programme d'alimentation en continu ou discontinu et des besoins des plantes. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter ICL / Everris www.icl-ef.com ou votre distributeur local. Appliquer des doses plus faibles dans les serres ou dans des conditions climatiques à températures élevées. *A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.*

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Granulométrie: combinaison de poudre et de prills. 85 % de produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm et les 15 % restants à travers un tamis à mailles de 5 mm.

Ingrédients: Nitrate de potassium [7757-79-1]; Urée [57-13-6]; Phosphate monoammonique [7722-76-1]; Phosphate monopotassique [7778-77-0]. *1: Substances et mélanges à base de matières vierges*

DE / AT

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK 20-20-20

20 % GESAMTSTICKSTOFF (N) 4,5 % Nitratstickstoff;
2,4 % Ammoniumstickstoff; 13,1 % Carbamidstickstoff.
20 % GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5)
20,0 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5);
20,0 % neutral-ammoniacitratlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5)
20 % KALIUMOXID (K_2O) wasserlöslich.
Chlorarm.

Spurennährstoffe sind vollständig wasserlöslich: 0,020 % Bor (B), als Borsäure / 0,015 % Kupfer (Cu), als Chelat von EDTA / 0,120 % Eisen (Fe), als Chelat von DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), als Chelat von EDTA / 0,010 % Molybdän (Mo), als Natrium / 0,015 % Zink (Zn), als Chelat von EDTA.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10..

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlich Aufwandmengen: Allgemeine Dosierungsrateneempfehlung für Baumschulerkübel und Topfpflanzen. 0,5-2,0 g/L in Gießwasser an die Pflanzen. Dosierungsrate abhängig davon, ob Intervall-Zufuhrungsprogramm oder kontinuierliches Zufuhrungsprogramm und Pflanzenanforderungen. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit ICL / Everris oder mit unserem Vertriebspartner. www.icl-ef.com. In Gewächshäusern oder unter heißen Klimabedingungen geringere Raten anwenden. *Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.*

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hinweis: Düngemittel ohne Ammoniumnitrat, keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Korngröße: Kombination von Pulver und Prills. Das Produkt passiert zu 85 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm, die verbleibenden 15 % passieren ein Sieb mit einer Maschenweite von 5 mm.

Inhaltsstoffe:
Kaliumnitrat [7757-79-1]; Harnstoff [57-13-6]; Monoammoniumphosphat [7722-76-1]; Kaliumdihydrogenphosphat [7778-77-0]. *1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen*

SI

SESTAVLJENO TRDNO ANORGANSKO GNOJILO Z MAKROHRANILI NPK mineralno gnojilo z mikrohranili, 20-20-20

20 % CELOTNI DUŠIK (N) 4,5 % Nitratni dušik;
2,4 % Amonijski dušik; 13,1 % Sečninski dušik.
20 % CELOTNI FOSFORJEV PENTOKSID (P_2O_5) 20,0 % vodotopni fosforjev pentoksid (P_2O_5); 20,0 % fosforjev pentoksid (P_2O_5), topen v nevtralnem amonijevem citratu.
20 % KALIJEV OKSID (K_2O) Vodotopen.
Nizko vsebnostjo kloridov.

Mikroheredu v celoti vodotopni: 0,020 % Bor (B), kot borova kislina / 0,015 % Baker (Cu), kelatirano z EDTA / 0,120 % Železo (Fe), kelatirano z DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), kelatirano z EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), kot natrij / 0,015 % Cink (Zn), kelatirano z EDTA.

Razpon vrednosti pH, ki zagotavlja stabilnost vsebovanih kelatov: Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

To gnojilo vsebuje sečnino, ki lahko sproča amoniak in vpliva na kakovost zraka. Odvisno od lokalnih pogojev je treba sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe. Proizvajalec tega gnojila je že sprejel sanacijske ukrepe, s tem da ma je dodal inhibitor ureaze.

Navodila za predvideno uporabo, vključno z odmerki: Priporočilo glede splošnega odmerka za sadike v posodah in rastline v loncih, 0,5–2,0 g/L v vodi za namakanje, ki je odvisi od intervalnega ali stalnega programa dovajanja in zahtev rastlin. Obrnite se na ICL / Everris ali na naslega lokalnega distributerja za posebna priporočila. www.icl-ef.com. V topli gredah in v vročih podnebjih razmerah uporabi nižji odmerek. *Uporabljati samo v skladu s potrebami rastlin. Ne presezite predvidenega odmerka.*

EUH210: Varnostl list na voljo na zahtevo.

Granulometrija: Kombinacija prahu in kep. 85 % proizvoda gre skozi sito z gostoto mreže 1 mm in preostalih 15% skozi sito z gostoto mreže 5 mm.

Sestavine:
Kalijev nitrat [7757-79-1]; Sečnina [57-13-6]; Monoamonijevega fosfata [7722-76-1]; Monokalijevega fosfata [7778-77-0]. *1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala*

SK

VIACZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY
NPK minerálne hnojivo obsahujúce mikroživiny, 20-20-20

20 % CELKOVÝ DUŠÍK (N) 4,5 % Dusičnanový dusík;
2,4 % Amonizadný dusík; 13,1 % Močovinový dusík.
20 % CELKOVÝ OXID FOSFORČNÝ (P_2O_5)
20,0 % oxid fosforečný (P_2O_5) rozpustný vo vode;
20,0 % oxid fosforečný (P_2O_5) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom .
20 % OXID DRASELNÝ (K_2O) Rozpustný vo vode.
Nízky obsah chloridu.

Mikroživiny sú kompletne rozpustné vo vode: 0,020 % Bór (B), ako kyselina boritá / 0,015 % Med (Cu), vo forme chelátu s EDTA / 0,120 % Železo (Fe), vo forme chelátu s DTPA / 0,060 % Mangán (Mn), vo forme chelátu s EDTA / 0,010 % Molybdén (Mo), ako sodík / 0,015 % Zinok (Zn), vo forme chelátu s EDTA.

Rozsah pH na zaručenie stability prítomných chelátov:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.

Návod na určené použitie vrátane dávkovania: Všeobecné odporúčanie pre dávkovanie pre sadenice v nádobkách a rastliny v kvetináčoch, 0,5–2,0 g/L v zavlažovacej vode pre rastliny. Dávkovanie závisí od toho, či ide o intervalový alebo nepretržitý zásobný program a požiadavky rastlín. Konkrétne odporúčania vám poskytne spoločnosť ICL / Everris alebo náš miestny distribútor. www.icl-ef.com. Primjenjivati niže kolčine u staklenicima ili u vrućetma vruće klime. *Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.*

EUH210: Bezpečnostný list dostupný na zaťiadosť.

Granulometria: kombinácia prášku a prill. 85 % produktu prejde sitom s veľkosťou ok 1 mm a zostávajúcich 15 % prejde sitom s veľkosťou oka 5 mm.

Zložky: Dusičnan draselný [7757-79-1]; Močovina [57-13-6]; Monofosforočnan amónny [7722-76-1]; Fosforečnan monodraselný [7778-77-0]. *1: Pôvodné látky a zmesi*

HR

SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA NPK mineralno gnojivo s makrohranjivima, 20-20-20

20 % UKUPNI DUŠIK (N) 4,5 % Nitratni dušik;
2,4 % Amonijski dušik; 13,1 % Amidni dušik
20 % UKUPNI FOSFORNI PENTOKSID (P_2O_5) 20,0 % fosforov pentoksid (P_2O_5) topljiv u vodi; 20,0 % fosforov pentoksid (P_2O_5) topljiv u neutralnom amonijevu citratu.
20 % KALIJEV OKSID (K_2O) Topljiv u vodi.
Sniženog klorida.

Mikro-hranjivihu su potpuno topivi u vodi: 0,020 % Bor (B), kao borna kiselina / 0,015 % Bakar (Cu), kelirano EDTA / 0,120 % Željezo (Fe), kelirano DTPA / 0,060 % Mangan (Mn), kelirano EDTA / 0,010 % Molibden (Mo), kao natrij / 0,015 % Cink (Zn), kelirano EDTA.

pH raspon kojim se jamči stabilnost prisutnih keliranih tvari: Cu od1,5 do 10; Fe od 1,5 do 7,5; Mn od 3 do 10; Zn od 2 do 10.

Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđene količine: Opća preporuka za količinu doziranja za biljke koje se uzgajaju u rasadniku u spremniku i za biljke u lončanicama, 0,5-2,0g/L u vodi za navodnjavanje biljaka. Količina doziranja ovisno o intervalu ili programu kontinuiranog hranidbe i zahtjevima biljke. Za odredene preporuke obratite se tvrtki ICL/ Everris ili našem lokalnom distributeru. www.icl-ef.com. Primjenjivati niže kolčine u staklenicima ili u vrućetma vruće klime. *Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.*

EUH210: Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Granulometrija: kombinacija praha i prila. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 85 % proizvoda, a ostalih 15 % kroz sito veličine otvora od 5 mm.

Sastojci: Kalijev nitrat [7757-79-1]; Urea [57-13-6]; Monoamonijev fosfat [7722-76-1]; Monokalijev fosfat [7778-77-0]. *1: Tvari i smjese iz nepreradenih sirovina*

HU

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 20-20-20

20 % ÖSSZES NITROGÉN (N) 4,5 % Nitrát-nitrogén;
2,4 % Ammónia-nitrogén; 13,1 % Karbamid-nitrogén.
20 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5) 20,0 % vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 20,0 % semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P_2O_5).
20 % KÁLIUM-OXID (K_2O) Vízben oldható.
Alacsony kloríttartalmú.

Mikroelemekkel dísített teljesen vízben oldódó:
0,020 % Bór (B), bórsav formájában / 0,015 % Réz (Cu), kelátképző anyag: EDTA / 0,120 % Vas (Fe), kelátképző anyag: DTPA / 0,060 % Mangán (Mn), kelátképző anyag: EDTA / 0,010 % Molibdén (Mo), nátrium formájában / 0,015 % Cink (Zn), kelátképző anyag: EDTA.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány:
Cu 1,5-10; Fe 1,5-7,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatásszélhet a levegő minőségére. A helyi viszonyokból függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

A tervezett felhasználásra vonatkozó utasítások, ideértve az alkalmazási dózist: Általános adagolási ajánlás konténerben nevelt és cserepes növények tekintetében, 0,5-2,0 g/L a növényekhez használt öntözővízben. Adagolás az időközből vagy a folyamatos adagolási programtól, valamint a növények igényeitől függ. Forduljon az ICL / Everris-hez vagy a helyi forgalmazójához a konkrét ajánlásokért. www.icl-ef.com. Üvegházakban vagy meleg éghajlat viszonyok között alacsonyabb arányokat kell alkalmazni. *Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt adagolást.*

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Szemcseméret: Por és prilek. A termék 85 %-a átesik 1 mm, a fennmaradó 15 % pedig 5 mm szemméretű szitán.

Összetevő:
Kálium-nitrát [7757-79-1]*; Karbamid [57-13-6]; Monoammónium-foszfát [7722-76-1]*; Kálium-dihidrogén-foszfát [7778-77-0]*. *1: Primer anyagok és keverékek*

AU / NZ

FERTILISER - NPK Fertiliser with micro-nutrients, 20-9-17

20 % TOTAL NITROGEN (N) 4,5 % As nitrate Nitrogen;
2,4 % As ammoniacal nitrogen; 13,1 % As urea nitrogen.
8,7 % PHOSPHORUS (P) Soluble in neutral ammonium citrate and water, 8,7 % P water soluble, 8,7 % P citrate soluble.
16,6 % POTASSIUM (K) Water soluble.
12,4 % As nitrate; 4,2 % As phosphate.
Low in chloride.

Micro-nutrients are completely water soluble: 0,020 % Boron (B) as boric acid / 0,015 % Copper (Cu) chelated by EDTA / 0,120 % Iron (Fe) chelated by DTPA / 0,060 % Manganese (Mn) chelated by EDTA / 0,010 % Molybdenum (Mo) as sodium/ 0,015% Zinc (Zn) chelated by EDTA.

Impurities: Biuret (maximum) 17.0 g/kg N;
Cadmium (maximum) 2,7 mg/kg ; 31.4 mg Cd/kg P;
Lead (maximum) 42.8 mg/kg; Mercury (maximum) 1.0 mg/kg.

WARNING: Do not swallow. The dust from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This fertilizer contains biuret. Repeated foliar sprays may cause damage to citrus. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of cadmium, lead and mercury in the soil. Depending on soil characteristics, irrigation water quality, plant species and variety, crop uptake of cadmium may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australia New Zealand Food Standards Code. In pasture, the offal from grazing animals may also exceed these limits. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

2113-215HA
PMG2113HAH (R115109121A)

PMG2113HAH_550x80x310