



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(I)/2011 και Ν 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4686 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για χορήγηση άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Ρουμανία και την πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα του προϊόντος αναφοράς Terrekί (αρ. άδειας 2863), σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009,

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΑΛΑΚΑΖΑΜ με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4151

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

21/03/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/11/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

JT Agro Europe sp z.o.o

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Alakazam

2. Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: flonicamid: 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 48,82% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: JT Agro Europe sp z.o.o, Πολωνία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: 1. JT Grosvenor Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
2. INDALVA S.L., Ισπανία6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: 1. JT Grosvenor Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
2. NITROFARM A.E., Θεσσαλονίκη
3. INDALVA S.L., Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες / Βαζάκια	10γρ. – 2Kg	HDPE COEX(HDPE/PA)
2.	Σάκοι	25Kg	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: flonicamid

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97,7 % (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Cropnosys India pvt Ltd., Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Cropnosys India pvt Ltd., Ινδία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση αφίδων σε μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές, τομάτα και κολοκυνθοειδή και για την καταπολέμηση αλευρώδη σε τομάτα και κολοκυνθοειδή.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε τον ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Υρ. σκ./δεκ. μέγιστη	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Μηλοειδή: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά NASHI	Αφίδες (<i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL, <i>Aphis pomi</i> - APHIPO) <i>Dysaphis pyri</i> - DYSAPY	12 – 14	20 – 100 (σε ιδιαίτερες περιπτώσεις 150)	Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, συνήθως στην αρχή της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. Για την <i>Dysaphis plantaginea</i> εφαρμόζεται η υψηλή δόση. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης και τον εξοπλισμό εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Brachycaudus helichrysi</i> - ANURHE, <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR)	12 – 14	20 – 100 (σε ιδιαίτερες περιπτώσεις)	Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, συνήθως στην αρχή της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. Στις αρχικές προσβολές εφαρμόζεται η χαμηλή δόση. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια, το στάδιο ανάπτυξης και τον εξοπλισμό εφαρμογής.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες
Τομάτα LYPES (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO)	10 – 12	40 – 100	Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής (στα θερμοκήπια όταν υπάρχει προσβολή σε περισσότερο του 5% των φύλλων από ένα ή περισσότερα έντομα). Στις αρχικές προσβολές εφαρμόζεται η χαμηλή δόση. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ανάπτυξη της βλάστησης.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 7-14 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> -TRIAVA)	20	---	Εφαρμόζεται στο έδαφος, ιδιαίτερα για τα ανήλικα στάδια, με το σύστημα άρδευσης. Το σκεύασμα διαλύεται αρχικά σε μικρή ποσότητα νερού. Η διάλυση γίνεται αμέσως πριν την εφαρμογή και εφαρμόζεται πριν το τέλος του κύκλου άρδευσης.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών*: 2 ανά έτος. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται μετά τη μεταφύτευση και το πρώτο σοκ (1-7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) και η επόμενη σε 10-14 ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		γρ. σκ./δεκ. μέγιστη	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)		
Κολοκυνθοειδή: (υπαίθρου και θερμοκηπίου) - Αγγούρι CUMSA - Αγγουράκι CUMSA - Κολοκυθάκι CUUPG - Κολοκύθα Πεπόνι CUMME - Καρπούζι CITLA	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> - APHIGO)	10	40 – 100	Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής (στα θερμοκήπια όταν υπάρχει προσβολή σε περισσότερο του 5% των φύλλων από ένα ή περισσότερα έντομα). Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ανάπτυξη της βλάστησης.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 7-14 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	20	---	Εφαρμόζεται στο έδαφος, ιδιαίτερα για τα ανήλικα στάδια, με το σύστημα άρδευσης. Το σκεύασμα διαλύεται αρχικά σε μικρή ποσότητα νερού. Η διάλυση γίνεται αμέσως πριν την εφαρμογή και εφαρμόζεται πριν το τέλος του κύκλου άρδευσης.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών*: 2 ανά έτος. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται μετά τη μεταφύτευση και το πρώτο σοκ (1-7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση) και η επόμενη σε 10-14 ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες.

* **ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ** – Επομένως στις περιπτώσεις όπου γίνονται 2 εφαρμογές με το σύστημα άρδευσης για καταπολέμηση αλευρώδη, να γίνεται μόνο μία εφαρμογή στο φύλλωμα για καταπολέμηση αφίδων.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Τομάτα, Κολοκυνθοειδή	3 ημέρες
Ροδακινιά	14 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	21 ημέρες
Δαμασκηλιά	35 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 9C

- Ο συνολικός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία flonicamid δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών που αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων αυτών.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος.
- Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) χωρίς την παρουσία μελισσών.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:


γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

EUH208 Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε τα χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe8 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία μελισσών.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Πρώτων Βοηθειών: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 3 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 21/03/2025



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας