

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ● **Σε περίπτωση κατάποσης**, καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ● **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό. ● **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. ● **Σε περίπτωση εισπνοής**: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Sp1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη: **-10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε καλλιέργειες φυλλωδών και καρποφόρων λαχανικών. **-10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε αμπέλι. **-20 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε ροδακινιά - νεκταρινιά μετά την ανθοφορία. **-30 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε πυρηνόκαρπα πριν την άνθηση.

Spe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, αφήστε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη, στα πυρηνόκαρπα.

Spe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες**. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινύσιων μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεσασυλλεκτικές χρήσεις: Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά: Μ. Ε (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης κατά την εφαρμογή). Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι: 3 ημέρες. Μαρούλι & άλλα σαλατικά, Σπανάκι & παρεμφερή, (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 2 ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι, (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 1 ημέρα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 Λίτρο (lt)

Αρ. Παρτίδας - Ημερ. Παραγωγής - Ημερ. Λήξης: Βλέπε συσκευασία

AFIPYR

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Pyrethrins (Φυσικό πύρεθρο) 4% β/ο

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 4012-P

Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών για την αντιμετώπιση μυζητικών εντόμων. Χαρακτηρίζεται από ταχεία και σύντομη διάρκεια δράσης και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στην εποχή απελευθέρωσης ωφέλιμων εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

Εγυυημένη Σύνθεση: Pyrethrins: 4% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 91,11% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ



H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208 Περιέχει **Pyrethrins**. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας παράλληλου εμπορίου-
Υπεύθυνος για διάθεση στην αγορά:



**Premier
Shukuroglou**

Premier Shukuroglou Cyprus LTD, Τηλ. 22815353, Λευκωσία
www.premier.com.cy, contact@premier.com.cy

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο Εφαρμογής-Εχθρός που ελέγχεται-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής):

Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά): Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*) με 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη δόση) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκάριο. Ψεκασμοί πριν την άνθηση, με την έναρξη της προσβολής.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*) με 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη δόση) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκάριο. Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.

Αμπέλι (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για **Τζιτζικάκια** (*Zygina rhamni*, *Scaphoideus titanus*) με 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη δόση) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκάριο. Ψεκασμοί μετά την άνθηση στο στάδιο μικρών καρπών.

Τομάτα - Μελιτζάνα - Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), **Αγγούρι - Κολοκύθι** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), **Πεπόνι - Κολοκύθα - Καρπούζι** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για **Αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη δόση) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκάριο. Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων.

Μαρούλι & άλλα σαλατικά, (σκαρόλα ή πικριδά, Αντιδι, Ρόκα, Φύλλα και βλαστοί του είδους brassica) **Σπανάκι, Ξέσκουλα, & παρεμφερή** (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Nasonovia ribisnigri*, *Aphis fabae*) με 75-90 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 κ.εκ./δεκ. (μέγιστη δόση) σε 65-80 λίτρα ψεκ. υγρού/δεκάριο. Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής.

Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Η δόση/ 100 λίτρα νερού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπτή δόση/δεκάριο. 2. Οι εφαρμογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. 3. Μην ψεκάτετε όταν φυσάει. 4. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φυλλών σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις. 5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3Α. Να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό ενεργίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε δυο φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό και απορριπτικά.

LA/FIPYR/ILT/CY/1

