

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ICC είναι υγρό και όξινης αντίδρασης σκεύασμα συμπυκνωμένου πενταένυδρου θειικού χαλκού ο οποίος βρίσκεται σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή. Η καινοτόμος τεχνολογία του ICC επιτρέπει στα ιόντα χαλκού να παραμένουν βιοενεργά μέχρι πλήρους απορροφήσής τους από τους φυτικούς ιστούς. Η μεγάλη διεισδυτική ικανότητα των ιόντων χαλκού στους φυτικούς ιστούς έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτούμενες δόσεις του ICC να είναι μικρές σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μορφές χαλκούχων σκευασμάτων με συνέπεια τη μείωση της τοξικότητας του ICC και τη δυνατότητα εφαρμογής του ακόμη και σε ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης του φυτού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αρκεί να μην γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΤΟ ICC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 899/08

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παρασκευάζεται στο 80° χλμ. εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Ύψατο Βιοτεχνίας

Η παραγωγός εταιρία AGROCURE (τ.Α. +30 2310797262) εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση του. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν τη χρήση του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Το ICC αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων στα εδάφη με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργοποίηση της απορρόφησης και άλλων ιχνοστοιχείων. Ενισχύει τη δραστηριότητα των αμυντικών μηχανισμών του φυτού. Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος (διαφυλλικά), με καθολική και ομοιόμορφη διαβροχή έως απορροής. Δημιουργεί ομοιογενές (χωρίς συσσωματώματα) και σταθερό υδατικό διάλυμα. Δε λερώνει και δε βάφει τα φυτά που ψεκάζονται. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και μέσω του εδάφους με υδρολίπανση. Η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται μετά από συμβουλή γεωπόνου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το ICC εφαρμόζεται προληπτικά ή θεραπευτικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων σε όλες τις καλλιέργειες όπως κηπευτικά, φρούλες, πατάτα, ψυχανθή, αροτριάδες καλλιέργειες, οπωροφόρα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, ροδιές, καλλυπιστικά, χλοοτάπητες και άλλες.

ICC®	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ*
ΜΙΚΡΕΣ	0,2 - 0,3 L ανά δεκάριο	50 - 150 cc ανά 100 L εώς 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητικό κύκλο
ΜΕΤΡΙΕΣ	0,3 - 0,4 L ανά δεκάριο	
ΜΕΓΑΛΕΣ	0,4 - 0,8 L ανά δεκάριο	

* Ελάχιστη ποσότητα νερού διάλυσης
60 L/δεκ. στα λαχανικά
και 100-150L/δεκ. στα οπωροφόρα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται / αναμειγνύεται με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα. Δε συνδυάζεται με fosetyl-Al

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες άνω των -4 °C, σε κλειστή αποθήκη, προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία.



ICC®
Ionic Copper Concentrate

ΘΡΕΨΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ


1L

Λίπασμα Χαλκού

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ β/ο:

Υδατοδιαλυτός
Ιοντικός Χαλκός (Cu⁺⁺) 5,2%
Υδατοδιαλυτό Θείο (S) 3,8%

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
CuSO₄·5H₂O



Διανομέας:



Premier
Shukuroglou

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
P.O.Box 12508, 2250 - Latsia, Cyprus
Tel: +357 22815353 - Fax: +357 22482331
www.premier.com.cy - contact@premier.com.cy



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H314
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα
και σοβαρές βλάβες.



H410
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: 3300-ROXR-W008-GDEK

Αρ. Εγγραφής 2986