

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών.

Εγγυημένη σύνθεση:

Formetanate 50,0% B/B

Βοηθητικές ουσίες 45,6% B/B

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Αρ. Άδειας: 2777

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρι απορροής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*). **Δόση** 125 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 80 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (BBCH63-64) φροντίζοντας να διαβρεχτεί προσεκτικά η ζώνη των τσαμπιών. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **1 εφαρμογή.**

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*). **Δόση** 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή στην πτώση πετάλων (BBCH67). Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **1 εφαρμογή.**

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*). **Δόση** 125 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 80 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. **1 εφαρμογή.**

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (PUMPKINS) (Υπαίθρου): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*). **Δόση** 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. **2 εφαρμογές** με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.

ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΝΤΙΔΙ (Υπαίθρου): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*). **Δόση** 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4 - 6 φύλλων (BBCH 14-15). **1 εφαρμογή.**

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips spp.*). **Δόση** 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων. **1 εφαρμογή.**

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ, ΖΕΡΜΠΕΡΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπες (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Thrips spp.*). **Δόση** 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 γρ.σκ./δεκ. μέγιστη με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δεκ. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. **1 εφαρμογή.**

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Φράουλα (Υ): **14 ημέρες.** Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (pumpkins) (Υ): **3 ημέρες.** Αμπέλι, Μαρούλι (Υ), Αντίδι (Υ), Καλλωπιστικά (Υ+Θ), Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια: **Μη εφαρμογές** (ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **1A.**

Να εναλλάσσεται με εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από αλκαλικές ενώσεις και το θείο.



ΚΙΝΔΥΝΟΙ

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: CWT0-604D-C00C-UVXR

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **P102** Μακριά από παιδιά. **P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. **P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. **P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **P321** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση διαμέσου αγωγών αυλακιών και αρδευτικών καναλιών.

SPe3 Για να προστατέψετε τον υδρόβιο οργανισμό να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, για όλες τις καλλιέργειες

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων**, για όλες τις καλλιέργειες.

SPe8 **Επικινδύνου για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα-επικονιστές να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε κάθε περίπτωση οι μελισσοκόμοι της περιοχής θα πρέπει να ειδοποιηθούν πριν την εφαρμογή.

EUH 401 Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P301+310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P305+P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγήστε οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Το συνητώμενο αντίδοτο είναι βιθεική ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μην χρησιμοποιείτε 2-PAM. Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαρτία συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμοκρασίες παγετού και θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 25°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυνματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποίηση το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

Τηλ.: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της Άδειας:

Gowan Crop Protection Limited

LE/DICARZOL50SP/CY/3