

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

ΚΑΒΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό μηχάνημα. Ξεπλύνετε το ψεκαστικό μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματά του, τρεις φορές με καθαρό νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

• **ΑΓΚΙΝΑΡΑ** για **Πίδιο** (*Boloniomyces cichoracearum*) με **δόση** 20 κ.εκ./δεκάριο μέγιστη και όγκο ψεκ. υγρού 40 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 40-55). Τρεις (3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 12 ημέρες.

• **ΠΑΡΑΓΓΙΤΙ** για **Κηλίδωση** (*Stemphylium vesicatum*), **Εκρίωση** (*Puccinia asparagi*) με **δόση** 50 κ.εκ./δεκάριο μέγιστη και όγκο ψεκ. υγρού 30-125 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί μετά την συγκομιδή (BBCH 40-89). Τρεις (3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

• **ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ** για **Φουξικλάδιο** (*Venturia inaequalis*) με **δόση** 15 κ.εκ./δεκάριο και όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο που οι καρποί έχουν φθάσει στο 77% του τελικού μεγέθους έως την ωρίμανση (BBCH 77-89). Τέσσερις (4) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-12 ημέρες.

• **ΑΓΓΟΥΡΙ (Υπόθρου)** για **Πίδιο** (*Podosphaera xanthii*, *Podosphaera funginea*) με **δόση** 50 κ.εκ./δεκάριο μέγιστη και όγκο ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Τρεις (3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

• **ΑΜΙΕΛΙ** (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) για **Πίδιο** (*Erysiphe necator*), **Μούρη αμύγ** (*Phyllosticta ampelidis*) με **δόση** 15-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την αρχή της βλάστησης έως την αλλαγή του χρώματος των ραγών (BBCH 13-81). Δύο - Τρεις (2-3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10-14 ημέρες.

• **ΛΑΧΑΝΟ (Κραμπί)** για **Άλτερνερίωση** (*Alternaria sp.*) με **δόση** 5-64 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη ανάπτυξης των κεφαλών έως και την πλήρη ανάπτυξη (BBCH 40-51). Δύο (2) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες.

• **ΣΑΧΑΡΟΤΕΥΤΙΑ** για **Κερκοσπορίωση** (*Cercospora beticola*) με **δόση** 20-30 κ.εκ./δεκάριο μέγιστη και όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 30-41). Τρεις (3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 15-20 ημέρες.

• **ΚΑΡΟΤΟ** για **Πίδιο** (*Erysiphe heraclei*), **Άλτερνάρια** (*Alternaria dauci*), **Mycoasphaeria spp.**, **Εκρίωση** (*Puccinia spp.*) με **δόση** 40-50 κ.εκ./δεκάριο μέγιστη και όγκο ψεκ. υγρού 10-50 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από την αρχή της ανάπτυξης των ριζών (διάμετρος >0,5 cm) μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 80% της αναμενόμενης διαμέτρου (BBCH 40-48). Τρεις (3) **εφαρμογές/καλ.περίοδο** με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 'Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΨΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
Αγγούρι (Υ): 3 ημέρες. **Αγκινάρα, Λάχανο (Κραμπί), Καρότο:** 14 ημέρες. **Μηλιά, Αχλαδιά, Αμνέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Σαχαρότευτλα:** 21 ημέρες. **Σπαράγγι:** Δεν εφαρμόζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ 'Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ'Η ΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ: Διακείμενη ανθεκτικότητα: Ομάδα Τρόπου Δράσης - FRAC: difenconazole. 3 Συνιστάται:

- η ενυδάτωση με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- εφαρμογή του σκευάσματος προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφυγή της θεραπευτικής εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 'Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΘΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 'Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιόλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (το νερό του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίτημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Εγκυμονείτε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ύπαρξη ανθεκτικότητας, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλες παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

MORE

25EC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο της
ομάδας των
τριαζολών (DMIs),
με προστατευτική
και θεραπευτική
δράση.

Απορροφάται γρήγορα
από το φύλλωμα των
καλλιεργειών και
κινείται διελασματικά.
Δρα παρεμποδίζοντας
την βιοσύνθεση της
εργοστερόλης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αρ. Άδειας: 4120-P

Εγγυημένη σύνθεση:
Difenoconazole 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 72,37 % β/β
Περιέχει αρωματικό διαλύτη
(CAS 64742-94-5)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
(EC)

Κάτοχος της άδειας -
Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

Παρασκευαστής:
Sharda Cropchem Limited

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

P201+P202 Ζητήστε ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση και μην χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.

P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα, και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΗΛΘΡΑΣΕΩΝ: 1401

ΔΙΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αεριοαερίσεις σταγονιδίων/ εκκενώματα.

P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια, μπότες, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φύλαξη και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεπίστροφής στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες.

P391 Μάξτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Αδίσταση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθωτρίτες επιφανείας και τους δρόμους.

Sp2 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στο λάχανο (κραμπί) να μην εφαρμόζετε σε αργιολίδη εδάφη με κλίση < 0,5%.
Sp3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στη μηλιά και αχλαδιά να αφήνεται από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** ή
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **15 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **5 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών σε **σαχαρότευτλα, αγκινάρα, σπαράγγι, αγγούρι, αμνέλι** και **καρότο** να αφήνεται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στο **λάχανο (κραμπί)** να αφήνεται από τα επιφανειακά ύδατα μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων**.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διεύθυνσης στις αναπνευστικές οδούς.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H351 Υποσιτο για πρόκληση καρκίνου.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρεταμμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση δερμάτος ή σκάσιμο.

EiH401 Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: 696X-EK5F-Y401-MGEA



Αριθ. Παρτίδας (Batch No): 550101
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date): 01/2025



L/MORE25EC/1LT/CY/1



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΥΤΟΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ!

Green Dot
Κύπρου

